Comunidad de Madrid

Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD

INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILANCIA VIH/SIDA Marzo 2025

Red de Vigilancia Epidemiológica

Martes, 1 de abril de 2025 *(Datos provisionales)*

Área de Vigilancia y Control de Enfermedades Transmisibles
Subdirección General de Vigilancia en Salud Pública
Dirección General de Salud Pública

Tfno.: +34 91370 08 51 - Fax: 91 370 08 83
Correo-e: vigilancia.its@salud.madrid.org

SITUACIÓN DEL VIH/SIDA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. DATOS A 31 DE MARZO DE 2025

1.- Diagnósticos de infección por VIH. 31 de marzo de 2025

Se han notificado a la Subdirección General de Vigilancia en Salud Pública 12.611 personas diagnosticadas de infección por VIH en el periodo 2014-2023. El 28,2% (3.551) residían fuera de la Comunidad de Madrid en el momento del diagnóstico, el 22,9% se diagnosticaron fuera de España y el 5,3% en otra Comunidad Autónoma. La mayoría de las personas diagnosticadas fuera de España residían en países de América Latina y un 60,6% llegaron a España en los últimos 23 meses. Estos 3.551 casos se excluyen para los análisis de incidencia, pero se consideran para los de prevalencia y mortalidad.

Diagnósticos de infección por VIH por año de diagnóstico.

	Hombres		Mujeres		Total
	N	%	N	%	N
2014	1.044	88,3	139	11,7	1.183
2015	913	89,1	112	10,9	1.025
2016	996	87,9	137	12,1	1.133
2017	959	88,9	120	11,1	1.079
2018	862	88,9	108	11,1	970
2019	839	89,2	102	10,8	941
2020	639	92,2	54	7,8	693
2021	565	86,8	86	13,2	651
2022	618	91,0	61	9,0	679
2023	629	89,1	77	10,9	706
Total	8.064	89,0	996	11,0	9.060

* Años con datos no definitivos

Edad al diagnóstico de infección por VIH

Edad		
Edad media al diagnóstico: 35,4años (DE: 11,0)		
	N	%
< 1 años	7	0,1
1-9 años	14	0,2
10-14 años	3	0,0
15-19 años	167	1,8
20-29 años	2.929	32,3
30-39 años	3.156	34,9
40-49 años	1.721	19,0
50-59 años	771	8,5
> 59 años	292	3,2

Personas diagnosticadas en este periodo que han fallecido: 162 (1,8%)

Tasas de incidencia por 100.000 habitantes por sexo y año de diagnóstico



* Fuente población: Padrón continuo del Instituto de Estadística de la CM.

Distribución según lugar de nacimiento

Lugar de nacimiento		
	N	%
España	**4.455**	**49,2**
Otros	**4.605**	**50,8**
- Europa occidental	**264**	**2,9**
- Europa Oriental	**244**	**2,7**
- América Latina y Caribe	**3.411**	**37,6**
- América del Norte	**28**	**0,3**
- África Subsahariana	**434**	**4,8**
- Norte de África y Oriente Medio	**129**	**1,4**
- Asia y Oceanía	**81**	**0,9**

Tasas de incidencia por 100.000 habitantes por lugar de nacimiento y año de diagnóstico



* Fuente población: Padrón continuo del Instituto de Estadística de la CM

Distribución según país de nacimiento, mecanismo de transmisión y sexo. Años 2014-2023

	Hombres					Mujeres			
	España		Otro			España		Otro	
	n	%	n	%		n	%	n	%
Mecanismo de transmisión									
PID	69	1,6	38	1,0		20	7,6	4	0,5
HSH	3.274	78,2	2.950	76,2					
HTX	309	7,4	449	11,6		204	77,6	655	89,4
Otros	6	0,1	9	0,2		3	1,1	9	1,2
Desconocido/ N.C.	534	12,7	426	11,0		36	13,7	65	8,9
Total	4.192	100	3.872	100		263	100	733	100

* PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen sexo con hombres; HTX: relaciones heterosexuales; N.C.: No consta

Retraso en el diagnóstico

El 10,5% de las personas diagnosticadas de infección por VIH han sido diagnosticadas también de sida en este periodo. Este porcentaje es de 9,9% en personas nacidas en España y de 11,0% en aquellas nacidas fuera de España.

Porcentaje de retraso en el diagnóstico y mediana de linfocitos CD4 por año de diagnóstico*

	N	Mediana linfocitos CD4	PEA (<200 células/µl)	DT (<350 células/µl)	<500 células/µl
2014	1.001	457	21,8	36,6	55,5
2015	881	458	19,4	35,0	55,1
2016	984	473	17,8	32,1	52,6
2017	920	420	22,4	40,3	60,1
2018	836	422	22,7	40,8	59,3
2019	844	402	21,4	43,5	60,9
2020	625	379	25,6	45,6	64,2
2021	554	381	23,5	45,5	67,7
2022	503	379	25,2	44,9	68,6
2023	591	379	21,2	43,8	65,5
14-23	7.739	421 (RI: 230-646)	21,7	39,9	59,8

* Cifra de linfocitos CD4 al diagnóstico disponible en 7.739 nuevos diagnósticos (85,4%). La "N" incluye las infecciones agudas y recientes. El valor de linfocitos CD4 de las infecciones agudas y recientes no se ha considerado para el cálculo de la mediana. Las infecciones agudas y recientes se han considerado diagnósticos precoces con independencia de la cifra de CD4. PEA: Presentación con enfermedad avanzada, DT: Diagnóstico tardío. Linfocitos CD4<500: Estadíos 2 y 3 del CDC (MMWR December 5, 2008/Vol.57/No.RR-10)

Porcentaje de retraso en el diagnóstico de infección por VIH. Años 2014-2023

Hombres

		<200 CD4	<350 CD4	<500 CD4
Total (6.885)		20,5%	38,4%	58,5%
Edad al diagnóstico de VIH	15-19 años (122)	9,0%	27,9%	45,1%
	20-29 (2.286)	11,5%	29,4%	50,6%
	30-39 (2.406)	19,9%	37,9%	59,8%
	40-49 (1.314)	28,5%	45,7%	63,5%
	50-59 (547)	35,8%	54,8%	70,9%
	> 59 años (202)	43,6%	61,9%	76,2%
Mecanismo de transmisión	PID (88)	27,3%	38,6%	61,4%
	HTX (676)	36,8%	58,9%	75,4%
	HSH (5.468)	16,3%	33,7%	54,9%
País de origen	España (3.599)	18,2%	32,7%	51,9%
	Otros (3.286)	23,0%	44,7%	65,8%
	1. Europa Occidental (216)	15,3%	31,5%	50,9%
	2. Europa Oriental (152)	27,6%	42,1%	59,9%
	3. América Latina y Caribe (2.570)	22,4%	45,0%	66,8%
	4. África Subsahariana (169)	32,5%	59,2%	75,1%
	5. Norte de África y Oriente Medio (97)	28,9%	42,3%	55,7%

Mujeres

		<200 CD4	<350 CD4	<500 CD4
Total (854)		31,9%	52,2%	70,4%
Edad al diagnóstico de VIH	15-19 años (21)	23,8%	47,6%	71,4%
	20-29 (176)	22,2%	46,0%	60,8%
	30-39 (290)	25,9%	48,3%	69,3%
	40-49 (177)	40,1%	55,4%	74,6%
	50-59 (121)	47,1%	63,6%	79,3%
	> 59 años (56)	44,6%	66,1%	76,8%
Mecanismo de transmisión	PID (19)	21,1%	26,3%	36,8%
	HTX (759)	31,6%	51,5%	71,0%
País de origen	España (232)	30,2%	43,1%	57,8%
	Otros (622)	32,5%	55,6%	75,1%
	1. Europa Occidental (11)	18,2%	45,5%	54,5%
	2. Europa Oriental (52)	32,7%	59,6%	73,1%
	3. América Latina y Caribe (341)	34,0%	59,2%	75,7%
	4. África Subsahariana (199)	29,1%	48,2%	74,9%
	5. Norte de África y Oriente Medio (12)	41,7%	50,0%	83,3%

PID: personas que se inyectan drogas; HTX: heterosexual; HSH: hombres que tienen sexo con hombres

2.- Características de los casos de sida y fallecidos con VIH. 31 de marzo de 2025

No se han excluido los pacientes con residencia fuera de la Comunidad de Madrid en el momento del diagnóstico de VIH.

Casos de sida. 2014-2023					Personas fallecidas con infección VIH. 2014-2023				
	Hombres		Mujeres			Hombres		Mujeres	
	n	%	N	%		n	%	N	%
2014	172	79,6	44	20,4	**2014**	153	76,5	47	23,5
2015	162	83,1	33	16,9	**2015**	216	84,7	39	15,3
2016	143	82,2	31	17,8	**2016**	172	82,3	37	17,7
2017	152	79,6	39	20,4	**2017**	191	83,0	39	17,0
2018	138	85,7	23	14,3	**2018**	182	83,9	35	16,1
2019	115	81,0	27	19,0	**2019**	180	87,0	27	13,0
2020	103	85,8	17	14,2	**2020**	169	83,3	34	16,7
2021	60	72,3	23	27,7	**2021**	153	82,3	33	17,7
2022	78	84,8	14	15,2	**2022**	181	82,6	38	17,4
2023	57	80,3	14	19,7	**2023**	65	85,5	11	14,5
14-23	1.180	81,7	265	18,3	**14-23**	1.662	83,0	340	17,0
Edad media (años)	42,6 ± 11,3		43,2 ± 12,4		**Edad media (años)**	55,9 ± 10,7		54,1 ± 10,2	
Grupos de edad	30-39: 32,4% 40-49: 29,6% 50-59: 19,6%		40-49: 35,1% 30-39: 22,3% 50-59: 21,9%		**Grupos de edad**	50-59: 47,3% > 59: 29,2% 40-49: 18,5%		50-59: 46,2% 40-49: 27,1% > 59: 22,4%	
Lugar de nacimiento	España: 53,1% Amé Latina: 33,1% Áfri Subsaha: 4,8%		España: 41,9% Amé Latina: 27,2% Áfri Subsaha: 20,4%		**Lugar de nacimiento**	España: 88,4% Amé Latina: 6,2% Eur Occiden: 2,9%		España: 87,1% Amé Latina: 6,2% Áfri Subsaha: 3,2%	
Mecanismo transmisión	HSH: 54,3% HTX: 16,4% PID: 10,1%		HTX: 71,7% PID: 12,5%		**Mecanismo transmisión**	PID: 55,1% HSH: 22,9% HTX: 10,0%		PID: 53,2% HTX: 38,8%	

3.- Prevalencia de infección por VIH.

El número de personas con VIH que no constan como fallecidas y que han sido atendidas en al menos una ocasión en un centro sanitario público o privado de la CM en los últimos 5 años es de 29.500. El 18,0% (5.305) han desarrollado sida.

Personas residentes en la CM con infección por VIH

	N	Tasa x 100.000 h
Total	29.500	420,9
Nacidos en España	16.666	312,0
Nacidos fuera de España	12.834	769,2
Hombres	24.654	734,6
Nacidos en España	13.914	536,8
Nacidos fuera de España	10.740	1405,8
Mujeres	4.846	132,7
Nacidos en España	2.752	100,1
Nacidos fuera de España	2.094	231,5

Edad		
Edad media: 48,6 años (DE: 12,9)		
	N	**%**
1-9 años	15	0,1
10-14 años	9	0,0
15-19 años	30	0,1
20-29 años	1.850	6,3
30-39 años	6.531	22,1
40-49 años	6.705	22,7
50-59 años	7.667	26,0
> 59 años	6.693	22,7

Lugar de nacimiento		
	N	**%**
España	16.666	56,5
Otros	12.834	43,5
- Europa occidental	874	3,0
- Europa Oriental	540	1,8
- América Latina y Caribe	9.862	33,4
- América del Norte	85	0,3
- África Subsahariana	1.003	3,4
- Norte de África y Oriente Medio	280	0,9
- Asia y Oceanía	180	0,6

Lugar de diagnóstico de VIH		
	N	**%**
Comunidad de Madrid	23.269	78,9
Otras Comunidades Autónomas	1.501	5,1
Fuera de España	4.730	16,0

Mecanismo de transmisión		
	N	**%**
HSH	15.116	51,3
PID	4.075	13,8
HTX	4.616	15,6
Vertical	228	0,8
HD/TF/Otros	122	0,4
Desconocido/NC	5.343	18,1

Tiempo transcurrido desde el diagnóstico de infección por VIH		
Mediana (años): 10 (RI: 3-21)		
	N	**%**
0-10 años	15.633	52,9
11-20 años	6.459	21,9
21-30 años	5.357	18,2
> 30 años	2.051	7,0