

7.2.16. Mortalidad por mesotelioma, hombres, 2001-2007

Figura 1: RRs** por sección censal para el municipio de Madrid y resto de la Comunidad.




Figura 3: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica.




Figura 1: La distribución espacial de la mortalidad por mesotelioma en hombres muestra mayor mortalidad fuera del municipio de Madrid que en la capital.

Figura 2: Respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid, dentro del municipio de Madrid es Villaverde el distrito que destaca, mientras que la mayor parte de las secciones censales afectadas pertenecen a los municipios de Parla, Aranjuez, Getafe, Valdemoro y Pinto, mostrando un patrón de agregación.

Figura 3 y tabla 1: La mortalidad por mesotelioma en hombres se asocia con la privación económica, observándose un claro gradiente de incremento del riesgo de muerte a medida que aumenta. Así, el riesgo de muerte es 2,13 veces superior en el quintil con peor situación socioeconómica respecto al de mejor situación.

Figura 2: RRs** por sección censal según distritos municipales de Madrid y grandes municipios de la Comunidad de Madrid.








Tabla 1: RR* de mortalidad por quintiles de privación económica e intervalo de credibilidad (95%).

Quintil	RR	IC
Q1	1	—
Q2	0.97	0.50-1.70
Q3	1.93	1.12-3.23
Q4	2.04	1.22-3.44
Q5	2.13	1.29-3.61

■ Mortalidad por mesotelioma, hombres, 2001-2007.
Riesgo relativo suavizado (%)



■ Mortalidad por mesotelioma, hombres, 2001-2007.
Probabilidad posterior RRs*>100



*RR: Riesgo Relativo.

**RRs: Riesgo Relativo suavizado de cada sección censal respecto al valor medio de la Comunidad de Madrid.