

Pauta vacunación frente a neumococo en el adulto Enero 2019

Grupo Poblacional	Nueva pauta		¿Qué se le administraba hasta ahora?
	SIN VACUNA PREVIA	CON VACUNA PREVIA (al menos una dosis de VNP23)	
60 y más años <u>sin</u> <u>factor de riesgo</u>	VNC13		VNP23 * Cohortes 1956-57: VNC13+VNP23
Adultos (15 y más años) con <u>patología</u> <u>crónica de base</u>	VNC13	VNC13 (intervalo 1 año)	VNP23 + Revacunación a los 60 años de edad
Personas de cualquier edad y de <u>alto riesgo</u>	VNC13+ VNP23 (intervalo 8 sem) + Revacunación a los 5 años con VNP23	VNC13 (intervalo 1 año) + Revacunación a los 5 años con VNP23	VNC13+VNP23 + Revacunación a los 5 años con VNP23

Grupos de riesgo para la vacunación frente a neumococo

	Enfermedad o situación	Pauta recomendada	Intervalo entre vacunas
GRUPOS DE ALTO RIESGO	<i>Immunodeprimidos</i>		
	Immunodeficiencias y deficiencias sistema complemento	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas
	Tratamiento inmunosupresor**	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas
	Asplenia o disfunción esplénica grave	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas
	Infección VIH	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas
	Insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas
	Trasplante de órgano sólido	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas
	Trasplante de progenitores hematopoyéticos	3d VNC13+VNP23*	24 meses
	<i>Immunocompetentes con las siguientes patologías</i>		
	Fístula de LCR	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas
	Implante coclear	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas
Antecedente de enfermedad neumocócica invasora confirmada	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas	
Cirrosis hepática	VNC13+VNP23*	al menos 8 semanas	
PATOLOGÍA CRÓNICA	Enf. Cardiovascular y respiratoria crónica	VNC13	-
	Enf. Neurológicas y neuromusculares graves	VNC13	-
	Enfermedad hepática crónica	VNC13	-
	Diabetes Mellitus	VNC13	-
	Enfermedad celiaca	VNC13	-
	Personas institucionalizadas	VNC13	-
	Alcoholismo y tabaquismo crónico	VNC13	-
	Receptores de concentrados de factores de coagulación	VNC13	-



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Salud Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Síndrome de Down

VNC13

-

* Revacunación con VNP23 al menos 5 años después.

**Incluye tratamientos con esteroides a dosis inmunosupresoras o con agentes biológicos.