

Queremos conocer su opinión

Desde la Dirección General de Salud Pública deseamos conocer su opinión y le animamos a cumplimentar el cuestionario al que puede acceder en este código QR. No le llevará más de 5 minutos de su tiempo y es anónimo.



ESCANEA
para rellenar
el cuestionario

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

frente a la **gripe**



Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD



Escanea para
obtener
más información



Comunidad
de Madrid

Campaña de vacunación para la protección frente a la gripe

La Comunidad de Madrid incluye en esta temporada la vacunación frente a la gripe a los niños entre 6 meses y los 4 años

¿A quiénes se administra?

A los **niños entre los 6 meses y los 59 meses** residentes en la Comunidad de Madrid.

La vacunación infantil frente a la gripe se realiza en los **centros de salud y consultorios locales del Servicio Madrileño de Salud** fundamentalmente, en los centros **municipales de Salud del Ayuntamiento de Madrid, Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid** y en los distintos **centros sanitarios** autorizados para la vacunación en la región.

¿Cómo afecta la gripe a los niños?

- La gripe es una enfermedad que se presenta fundamentalmente en otoño-invierno, período que se denomina temporada de la gripe. El virus de la gripe cambia con mucha facilidad, siendo diferente cada temporada.
- La frecuencia de la gripe en niños es muy elevada, entre tres y cuatro veces más alta que en adultos.
- Los niños liberan mayor cantidad de virus y durante un período de tiempo más prolongado que los adultos, por lo que son transmisores de la enfermedad.
- La gripe es causa de hospitalizaciones, visitas médicas y consumo de antibióticos en la población infantil sana. Las complicaciones que pueden aparecer son sobre todo respiratorias, como la obstrucción bronquial y neumonía, y también la otitis media aguda.

¿Cómo podemos evitar la infección por gripe?

- La forma de prevenir la gripe es la **vacunación**, que habrá de realizarse cada temporada.
- La vacunación infantil también protege de forma indirecta al resto de la población, como a las personas mayores de 60 años, quienes tienen más riesgo de sufrir complicaciones y mortalidad.
- Hay disponibles **dos tipos de vacunas** con indicación infantil: vacunas inactivadas de administración intramuscular o subcutánea profunda y vacuna de virus atenuados de administración intranasal. Ambos tipos de vacuna son eficaces y seguras en población infantil.
- La **vacuna intranasal** se administrará a los **menores nacidos en 2019, es decir, que tendrán o cumplirán 4 años de edad en 2023, y que no estén inmunodeprimidos**.
- Se recomienda la administración de una **dosis única** de vacuna, excepto en niños con condiciones de riesgo en los que se administrarán dos dosis separadas al menos cuatro semanas.

¿Ocasiona efectos secundarios?

Los propios de cualquier medicamento de inmunización o vacunas. Los efectos secundarios más frecuentes de la vacuna inyectada son: irritabilidad y pérdida de apetito. Los efectos secundarios más frecuentes de la vacuna intranasal son: malestar, congestión nasal, febrícula, cefalea y mialgia.

Cualquier problema de salud que aparezca después de la administración de este medicamento puede consultarlo con su pediatra.

Además, si lo desea, puede notificar directamente los acontecimientos adversos que considere relacionados con este medicamento en <https://www.notificaram.es>