

Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray



© Juan Carlos Campos


Marasmius oreades (Bolton) Fr.



© Javier Marcos y Miguel Ángel Ribes

Senderueña, seta de carrerilla

Cortinarius sp. (C. trivialis J.E. Lange)



© Miguel Ángel Ribes

	Cortinarius croceus	Marasmius oreades
Sombrero	Pardo oliváceo, no higrófono	Beige crema, higrófono
Láminas	Amarillentas, escotadas, finas	Blanco crema, escotadas, medianamente gruesas
Pie	Amarillento, frágil	Cremoso, elástico, resiste la torsión
Observaciones	<p>El género <i>Cortinarius</i> es muy amplio e incluye especies con formas, colores y tamaños muy variados, pero todos ellos presentan, más o menos desarrollada, una cortina (similar a una tela de araña) que va del borde del sombrero hasta el pie, protegiendo las láminas. Más tarde se desprende del borde del sombrero y finalmente termina pegada al pie, donde en ocasiones sólo es visible por pequeños restos de cortina teñidos de color pardo ferruginoso por la acumulación de esporas. <i>Cortinarius croceus</i> fructifica en pinares, mientras que <i>Marasmius oreades</i> en praderas y claros de bosques. La confusión puede llegar a ser muy peligrosa, pues <i>C. croceus</i> puede ser mortal. No puede comercializarse ninguna especie del género <i>Cortinarius</i>.</p>	

Cortinarius orellanus Fr.



© Juan Carlos Campos

Cantharellus pallens Pilát (= C. subpruinusos Eyssart. & Buyck)



© José Cuesta Rebozuelo, cabrilla, seta de San Juan

Cantharellus cibarius Fr.



Rebozuelo, cabrilla, seta de San Juan

© Miguel Ángel Ribes

	<i>Cortinarius orellanus</i>	<i>Cantharellus pallens</i>	<i>Cantharellus cibarius</i>
Sombrero	Pardo rojizo. Separable del pie	Amarillo anaranjado, con zonas blanquecinas, se mancha de rojo al manipular. No separable del pie	Amarillo anaranjado, sin zonas blanquecinas, no se mancha de rojo al manipular. No separable del pie
Láminas	Láminas verdaderas, de color pardo rojizo	No tiene láminas verdaderas, son pliegues	No tiene láminas verdaderas, son pliegues
Pie	Pardo amarillento	Amarillo anaranjado	Amarillo anaranjado
Observaciones	<i>Cortinarius orellanus</i> es una especie potencialmente mortal, que produce un síndrome nefrotóxico, cuyos síntomas pueden aparecer bastantes días después de la ingestión. Fructifica en bosques de planifolios, pudiendo compartir hábitat con diversas especies de <i>Cantharellus</i> comestibles, por lo que se deben extremar las precauciones. <i>Cantharellus pallens</i> y <i>C. cibarius</i> prácticamente sólo se diferencian en el color del sombrero, amarillo sin manchas rojizas en <i>C. cibarius</i> y blanco amarillento con manchas rojizas en <i>C. pallens</i> , y se han comercializado tradicionalmente ambos como <i>C. cibarius</i> (rebozuelos), por lo que hay que considerarlos a ambos como comercializables. No puede comercializarse ninguna especie del género <i>Cortinarius</i> .		