

2020

Planta del mes

| | | | | | |
|-----|------------|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |

Juncus acutus (L.) Torr. Ex Retz




Parque Regional del Sureste

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Diversidad vegetal de riberas



| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HOJAS | | | | | | | | | | | | |
| FLORES | | | | | | | | | | | | |
| FRUTOS | | | | | | | | | | | | |

¿Cómo es?

Juncus acutus una planta herbácea perenne, de 70 a 180 centímetros, densamente cespitosa, con brotes intravaginales. **Rizoma** corto, de 8 mm de diámetro. **Tallos** de 79-165 cm x 2,5-5,4 mm de diámetro, robustos, ligeramente estriados. **Hojas** todas basales, en número de 2-8 por cada brote, dísticas, todas provistas de lámina; vainas más o menos abiertas, sin aurículas, de coloración pardo claro a castaño rojiza, brillantes; lámina de 37-42 cm x 1,9-3,1 mm, muy parecida al tallo, cilíndrica, punzante. **Inflorescencia** de 6-27 cm, pseudolateral, en antela 2-3 veces ramificada, multiflora, formada por capítulos, compacta o laxa, con dos brácteas foliáceas, la inferior de 5-30 cm, frecuentemente más larga que la inflorescencia, con vaina amplia y lámina que parece la continuación del tallo, punzante, la superior 2-10 cm, más corta que la inflorescencia, rara vez igual, punzante o no. **Flores** subsésiles; tépalos de 2,4-3 mm, iguales o subiguales en longitud, rígidos, castaños, al menos en la parte superior, brillantes. **Fruto** de 3-6 mm, obovoide, ovoide o elipsoideo, con la parte superior cónica o más o menos redondeada; castaño o rojizo, brillante. **Semillas** de 0,8-1,7 mm, fusiformes o irregularmente poliédricas, ligeramente estriadas, de un pardo rojizo, con apéndices escarioso-hialinos.

¿Dónde podemos encontrarla?

El denominado *junco redondo* es propio de Europa occidental, la región mediterránea, Macaronesia, este de Norteamérica, Sudamérica, África del Sur, Australia y Nueva Zelanda. No es raro en los municipios del Parque Regional del Sureste, en torno al eje del río Jarama; también en la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola (Aranjuez).

¿Cuál es su hábitat?

Praderas y juncales con suelos húmedos durante casi todo el año. Sus hábitats ideales son las zonas con alta tasa de salinidad y suelos con capa freática superficial, bordes de laguna, humedales, arroyos y terrenos encharcados.

¿Grado de protección?

Esta especie de la familia Juncaceae no tiene ninguna protección porque no se encuentra en peligro.

¿Sabías que?

El nombre genérico deriva del nombre clásico latino *junger*, "para unir o vincular", debido a que los tallos se utilizan para unir o entrelazar. En cestería, el tallo se emplea para tejer cestos y adornos, también como fibra vegetal para el atado o para hacer techumbres y setos naturales.