

Colmilleja, locha

Cobitis paludica
(De Buen 1939)

Fam COBITIDAE



• Descripción:

- Cuerpo alargado (pero comparativamente más gruesa que lamprehuela).
- Una sola aleta dorsal de naturaleza homogénea adelantada respecto a la ventral.
- Aleta caudal redondeada en forma de brocha.
- Tamaño normalmente menor de 10 cm (inferior a 13 cm)
- Color muy variable con manchas oscuras y redondeadas alineadas en el cuerpo y aletas. Los machos más pequeños, con manchas más lineales y marcadas y en el segundo radio de las aletas pectorales presentan una escama o lámina circular blanca denominada canestrini.
- Boca pequeña con seis barbillones cortos.
- Con una pequeña espina bajo el ojo, que utiliza para su defensa.

• Habitat:

- Aguas de cierta corriente de los tramos medio-altos de los ríos.
- Muy sensible a la contaminación y exigente en oxígeno disuelto.
- De costumbres crepusculares.
- La mayor parte del tiempo oculta en el sustrato o entre la vegetación.

• Reproducción:

- Desde el comienzo de la primavera sobre excavaciones realizadas en la grava del lecho del río, donde las hembras depositan aproximadamente dos centenares de huevos.

• Alimentación:

- Materia orgánica e invertebrados acuáticos.

• Distribución geográfica:

- Mitad norte de la península

• Protección:

- No pescable. Anejo III C.Berna 82/72.
- "Vulnerable" según Libro Rojo de los Vertebrados de España.

