

## Gobio

*Gobio gobio*  
(*Cyprinus* o *Leuciscus gobio* Linnaeus 1758)

Fam CYPRINIDAE



Exó.

Cip rínidos



### • Descripción:

- Cuerpo: Fusiforme, alargado.  
Cabeza y ojos grandes. Boca ínfera con un par de barbillones.  
Escamas grandes, 38-50 en línea dorsal.
- Aletas: 1 sola dorsal corta a la altura de las ventrales.  
Caudal muy ahorquillada.
- Color: Pardo-negro-verdoso por el dorso y algo azulado por el lomo.  
Cuerpo con unas características grandes manchas alineadas en el lomo.  
Ocelo oscuros en aleta dorsal y caudal, alineados en los radios.
- Tamaño pequeño (hasta 15-17 cm).  
Puede asimilarse a un pequeño barbo con sólo 2 barbillones.  
Puede llegar a vivir 6-8 años.

### • Habitat:

- Exigente en calidad de aguas.  
Tramo medio de ríos tranquilos y orillas de lagos y embalses.  
Especialmente en fondos de grava y arena de aguas limpias.
- Comportamiento sedentario y gregario.

### • Reproducción:

- Maduran sexualmente a los 2-3 años.
- Freza a finales de primavera-verano (mayo a junio), depositando de 2.000 a 7.000 huevos/hembra (de 1,5 a 2 mm) en función de su tamaño. Pueden tardar de 10 a 30 días en eclosionar.

### • Alimentación:

- Bastante omnívoro: invertebrados bentónicos, larvas, y materia orgánica.

### • Distribución geográfica:

- Por casi toda Europa y Asia. Introducido y aclimatado en muchos de nuestros ríos desde mediados del siglo pasado para ser empleado como cebo vivo.
- En el Jarama, Guadalix, Lozoya, Manzanares, Guadarrama, Tajo y Alberche.

### • Pesca:

- Cupo máximo por día de 30 ejemplares y talla mínima de 8 cm.
- Protección: En el Libro Rojo de los Vertebrados de España: "vulnerable".

