

2026

Insecto del mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Strophomorphus porcellus (Schönherr, 1832)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO												
LARVA												
PUPA												
IMAGO												

¿Cómo es?

Strophomorphus porcellus es un coleóptero de pequeño tamaño, que mide entre 5 y 7,5 mm de longitud. De cuerpo redondeado, cubierto de escamas blancas, marrones y grises y pelos largos y finos en la parte superior. La cara ventral tiene menos escamas y pelos más cortos. El rostro es corto, las escotaduras son anchas y visibles desde arriba, llegando hasta los ojos, que son pequeños, cónicos y ligeramente retraídos. Las antenas son largas, con el escapo alcanzando el margen anterior del pronoto.

¿Dónde podemos encontrarlo?

Extendido por toda la región mediterránea europea desde España hasta Turquía. Ausente en Portugal. También se conoce de Chipre. Hacia el este alcanza Ucrania, Turkmenistán y Uzbekistán. Por la parte mediterránea africana vive en Egipto, Israel, Jordania, Líbano y Siria. En la península ibérica aparece en el tercio oriental de clima mediterráneo. En la Comunidad de Madrid ocupa el cuadrante sudoriental. En el Parque Regional del Sureste no es abundante pero aparece disperso, aquí y allá, en la mayoría de los municipios.

¿Sabías que?

Los curculiónidos, conocidos comúnmente como gorgojos o picudos, comprenden una familia de coleópteros fitófagos que se caracteriza por tener una estructura facial alargada en forma de pico (rostro) u hocico; de cuerpo pequeño, variando de 1 a 50 mm, que puede ser alargado, ovalado o casi esférico; las antenas son acodadas. Es una de las familias más diversas del reino animal, con más de 85.000 especies descritas en todo el mundo.

Su descubridor fue el entomólogo sueco Carl Johan Schönherr (Estocolmo, 1772 – Sparresäter, 1848); hijo de un inmigrante alemán que se había establecido como fabricante de seda. A los 19 años, Carl Johan se hizo cargo, junto a su madre, de la empresa familiar y la hizo crecer considerablemente llegando a emplear a 200 trabajadores. En 1805, se asoció con Erik Lundgren y en 1811 le vendió la empresa retirándose a su mansión de Sparresäter, en Lerdala, a las afueras de Skara, Västergötland, donde fallecería a los 76 años.

Schönherr se aficionó a la entomología a la edad de 12 años, interés que se vio incentivado posteriormente por su amistad con Gustaf Johan Billberg, cuñado de su segundo matrimonio. Fue un eminente especialista en coleópteros, incluyendo los curculiónidos, y cooperó con Carl Henrik Boheman y Leonard Gyllenhaal. Describió numerosas especies nuevas en su obra *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae, specie novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman; et entomologis aliis illustratae* (París, Roret, 1833-1845). Fue miembro de la Real Academia de las Ciencias de Suecia y, desde 1834, de la Real Sociedad Entomológica de Londres.



¿Cuál es su hábitat?

Strophomorphus porcellus se encuentra en ambientes semiáridos y puede ser observado también en entornos ajardinados. Se refugian a veces bajo piedras y otras entre la hojarasca.

¿Grado de protección?

Strophomorphus porcellus, que pertenece a la familia Curculionidae, carece de protección porque no la necesita. El factor de riesgo más importante para su supervivencia es la pérdida de hábitat.

¿Cómo vive?

La larva vive bajo el suelo alimentándose de raíces. Durante el mes de marzo o abril, según la climatología, se transforma en pupa y al final emergen del suelo los primeros adultos. Al cabo de unas semanas, las hembras, tras el apareamiento, realizan la puesta en el suelo.

El adulto es polífago y se alimenta de las hojas de numerosas especies de plantas.



Parque Regional
del Sureste

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Insectos

