

2026

Mariposa del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Orthosia (Monima) cerasi (Fabricius, 1775)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO												
ORUGA												
CRISÁLIDA												
IMAGO												

¿Cómo es?

Orthosia cerasi es una mariposa de tamaño medio, con una envergadura alar entre 30 y 40 milímetros. Especie de coloración muy variable; su tonalidad oscila entre pardos claros y cobrizos; destacando sus grandes estigmas, finamente bordeados de claro, las líneas postmedia y subterminal formadas por la alineación de pequeños puntos oscuros y, entre ambas, otra línea recta con una sección clara y otra oscura superpuesta. Ala anterior gris rojiza, más o menos salpicada de oscuro: líneas internas y externas negruzcas, indistintas; estigmas orbiculares y reniformes anillados de ocre; línea submarginal ocre precedida por un tono fusco o rojizo; claviforme mayormente sin marcas; venas hacia termen pálidas: ala posterior gris, el fleco más pálido. La especie varía según la cantidad de rojo presente; — ab. *pallida* Tutt es gris pálido, a veces con un rubor ocre; — *obliqua* Vill. es gris más oscuro con marcas más claras; — *suffusa* Tutt es una forma gris negruzca igualmente bien marcada; de estas formas grises, solo la segunda, *obliqua* Vill., es común; por otro lado, cuando predominan los tintes rojos tenemos a la denominada forma *rufa* Tutt, que también es escasa; en *junctus* Haw. los estigmas superiores, generalmente separados, son coherentes; esta conexión accidental se da ocasionalmente en todas las formas: — en ab. *rufannulata* Haw. los estigmas están bordeados de, y la línea submarginal está coloreada de rojizo en lugar de ocre. Las alas posteriores son de tonalidad gris con las fimbrias claras.

La oruga tiene un tamaño máximo de unos 4 centímetros, es de color verde claro, finamente moteada con la línea dorsal un poco más claramente marcada y dos bien marcadas en el segmento anal y detrás de la cabeza con las líneas horizontales claras; toda su superficie está salpicada de diminutos puntos claros.

La crisálida es de color crema y pasa el invierno en el suelo. Después de la floración en el mes de marzo se puede observar el vuelo de adultos. Presenta una sola generación anual.

¿Dónde podemos encontrarla?

Se distribuye por toda Europa y, hacia el este, alcanza Turquía, Oriente Medio, Transcaucasia, Rusia y Siberia oriental. En la península ibérica está bien repartida y abunda, en general, por todas partes. Bien distribuida tanto en Madrid como en el Parque Regional del Sureste.

¿Cuáles son sus plantas nutricias?

Como plantas nutricias de *Orthosia cerasi* se describen distintos árboles: almendro, cerezo y otros *Prunus*, manzano, *Quercus*, *Salix*, *Ulmus*, *Populus*, *Rhamnus*, y *Betula*.

¿Grado de protección?

La denominada *oruga verde del almendro* carece de protección porque, evidentemente, no la necesita, ya que está considerada una plaga, con las pérdidas económicas respectivas en los cultivos, en particular el almendro. Por tanto, no existen factores de riesgo para su supervivencia.



¿Cuál es su hábitat?

Esta especie, que pertenece a la familia Noctuidae, habita en bosquetes con herbazales mixtos y monte bajo, huertos, setos, parques urbanos, etc.

¿Sabías que?

Como otros noctuidos, es atraída por las luces durante la noche. Se considera a *Orthosia cerasi* una plaga agrícola con alta incidencia en los almendros. En primavera, después de que la almendra cuaje, es cuando se pueden ver los primeros daños en los árboles. Por esas fechas se produce la emergencia de adultos del lepidóptero y, poco después, se inicia la puesta de huevos en el árbol. Tras la eclosión, las orugas penetran en las almendras aún sin endurecer para alimentarse. Una misma larva puede alimentarse de varios frutos, reduciendo la cosecha de manera más o menos importante según los casos. En la práctica, se utilizan feromonas sexuales para el seguimiento del vuelo de adultos y determinar el momento de la aparición de los adultos y, de esa manera, poder adoptar las medidas adecuadas para combatirla. Como medidas alternativas al control químico y para minimizar su uso, habrá que considerar las medidas de prevención y/o culturales, que pueden ser alternativas a su uso. Por otra parte, no se conoce ningún parásito que pueda controlar las orugas.