



Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior
Convocatoria correspondiente al curso 2025 – 2026
(RESOLUCION de 12 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Educación
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

Código del ciclo: AGAS02	Denominación completa del título: TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Clave o código del módulo: 0812	Denominación completa del módulo profesional: GESTIÓN CINEGÉTICA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba constará de 50 preguntas tipo test con cuatro respuestas cada una de las cuales sólo una será la correcta. Duración: 60 minutos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
Todas las preguntas del examen tienen el mismo valor. El examen tiene un valor de 10 puntos. Cada pregunta bien contestada sumará 0,2 puntos, mientras que cada pregunta mal contestada restará 0,066 puntos.

CALIFICACIÓN
.....

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

1. Dentro del estudio de la morfología de las especies cinegéticas, ¿qué establece la Regla de Allen respecto a la adaptación de los animales a su entorno climático?

A) Los animales de climas fríos tienden a tener una mayor masa corporal para reducir la pérdida de calor.

B) Los animales de climas cálidos presentan extremidades más largas y desarrollados para facilitar la termorregulación.

C) Las especies del sur desarrollan un pelaje más denso y oscuro para protegerse de la radiación solar.

D) El dimorfismo sexual es mucho más acusado en las poblaciones que habitan en latitudes altas.

2. ¿Cuál es el periodo de celo en la Península Ibérica del lobo?

A) De enero a marzo

B) De septiembre a diciembre

C) De abril a junio

D) Es una especie poliéstrica anual, por lo que puede ocurrir en cualquier mes dependiendo de la disponibilidad de alimento.

3. Sobre la biología y ecología del zorro, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Es un animal polígamo estacional donde el macho se desentiende totalmente del cuidado y alimentación de la prole.

B) Alcanza la madurez sexual normalmente a partir del segundo año de vida

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

C) Presenta una gran plasticidad ecológica

D) Las crías son precociales: nacen con los ojos abiertos y capacidad de abandonar la madriguera a las dos semanas de vida.

4. En la diferenciación de huellas entre jabalí y corzo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La huella del jabalí es más estrecha y alargada que la del corzo, sin presencia de guardas.

B) La huella del corzo es más pequeña, fina y puntiaguda, mientras que la del jabalí es más ancha, redondeada y puede mostrar guardas.

C) El corzo deja huellas más grandes que el jabalí, con pezuñas muy abiertas y profundas.

D) Ambos presentan huellas prácticamente idénticas, diferenciándose únicamente por la profundidad del rastro dado que el peso de jabalí es mayor.

5. En relación con los criterios biométricos empleados para la identificación en campo de excrementos de lobo ibérico frente a zorro, ¿qué combinación de rangos morfométricos es la más compatible con la literatura técnica de rastreo de carnívoros silvestres?

A) Lobo: longitud de 20–30 cm y diámetro de 5–7 cm. Zorro: longitud de 15–20 cm y diámetro de 2,5–4 cm.

B) Lobo: longitud de 10–20 cm y diámetro de 2,5–4 cm. Zorro: longitud de 8–10 cm y diámetro de 2 cm.

C) Lobo y zorro presentan rangos morfométricos equivalentes, siendo el contenido trófico el único criterio diagnóstico fiable.

D) Lobo: longitud inferior a 10 cm y diámetro menor de 2,5 cm. Zorro: longitud de 3–7 cm y diámetro menor a 2 cm.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

6. En un coto cerrado se capturan y marcan 50 ciervos. Posteriormente se realiza una segunda captura de 20 individuos, de los cuales 10 estaban marcados. Según el estimador de Estimador de Lincoln-Petersen, ¿cuál es el tamaño poblacional estimado?

- A) 50 individuos
- B) 100 individuos
- C) 150 individuos
- D) 200 individuos

7. En los censos de fauna realizados desde oteaderos o estaciones de observación en puntos elevados, ¿qué definición describe con mayor precisión el significado del coeficiente de detectabilidad empleado en las fórmulas de estimación de densidad poblacional?

- A) La proporción de superficie del área circular teórica que resulta visualmente accesible desde el punto de observación, en función de la orografía y de la cobertura vegetal.
- B) La probabilidad o proporción estimada de individuos realmente presentes en el área de muestreo que son detectados y contabilizados durante el censo.
- C) El factor utilizado para corregir el radio máximo de observación en las bandas concéntricas más alejadas del observador.
- D) El cociente entre el número de individuos observados y la distancia recorrida hasta el punto de observación.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

8. ¿Qué es el Observatorio Cinegético y cuál es su función principal?

- A) Un centro físico de interpretación de la naturaleza gestionado por el Estado
- B) Una herramienta digital de colaboración entre cazadores y científicos para la monitorización de poblaciones.
- C) Un sistema de vigilancia mediante cámaras térmicas para evitar el furtivismo que se utiliza de manera privada en los cotos de caza.
- D) Una base de datos sobre control de poblaciones que lleva el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)

9. ¿Cuál de los siguientes métodos se considera de observación directa?

- A) Conteo de excrementos o huellas en una parcela.
- B) Análisis de la frecuencia de vocalizaciones
- C) Utilización del método Emler
- D) Evaluación de daños en la vegetación por ramoneo.

10. El Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) se calcula mediante la fórmula:

- A) $IKA = \text{Número de animales vistos} / \text{Kilómetros recorridos}$
- B) $IKA = \text{Kilómetros recorridos} / \text{Superficie del coto}$
- C) $IKA = \text{Animales vistos} / \text{Ancho del transecto}$
- D) $IKA = \text{Número de avistamientos} / \text{Tiempo total de observación}$

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

11. ¿Qué concepto define el número máximo de individuos de una especie que un ecosistema puede mantener de forma indefinida sin degradar el hábitat?

- A) Tasa de extracción.
- B) Potencial biótico.
- C) Capacidad de carga.
- D) Densidad relativa.

12. En la metodología de censo por conteo de excrementos, si el número de grupos fecales encontrados y el tiempo de permanencia son constantes, ¿cómo afecta un aumento en la tasa de defecación al resultado de la densidad final?

- A) La densidad aumenta
- B) La densidad disminuye
- C) La densidad permanece igual
- D) La densidad se duplica automáticamente.

13. En el contexto de la gestión de poblaciones de cinegéticas, ¿en qué consiste la aplicación de la “Regla de Birkman”?

- A) En la obligación de abatir únicamente a los ejemplares de mayor edad
- B) En que la presión de caza debe centrarse exclusivamente en las hembras para controlar la tasa de natalidad y evitar la sobrepoblación del acotado.
- C) En ajustar el número de capturas permitidas en función de los resultados de censos o inventarios poblacionales para asegurar un aprovechamiento sostenible.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

D) En fijar un cupo de capturas constante cada año que tiene que quedar marcado en el plan de gestión

14. En relación con el diseño y la funcionalidad de los cercones de manejo (capturaderos) y las naves de manejo en explotaciones cinegéticas de caza mayor, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Los cercones de manejo deben situarse siempre en las zonas de mayor pendiente del terreno para facilitar el drenaje natural de los purines.

B) En las naves de manejo, el uso de pasillos curvos y paredes ciegas es una técnica recomendada para reducir el estrés del animal

C) Los cercones de manejo no requieren de una zona de "pre-vacío" o embudo, ya que los ciervos y jabalíes entran directamente a la manga de contención por instinto gregario.

D) El suelo de las naves de manejo debe ser preferiblemente de hormigón pulido y brillante para facilitar la desinfección química rápida entre lotes de animales

15. En relación con las dos subespecies de rebeco presentes en la Península Ibérica (*Rupicapra pyrenaica pyrenaica* y *Rupicapra pyrenaica parva*), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La subespecie cantábrica presenta mayor tamaño corporal y cuernas más robustas que la pirenaica, adaptada a terrenos más abruptos.

B) La subespecie pirenaica es más pequeña y de pelaje más claro durante todo el año que la cantábrica.

C) Ambas subespecies son idénticas morfológicamente y solo se diferencian por su distribución geográfica sin rasgos diagnósticos.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

D) La subespecie cantábrica presenta generalmente menor talla y cuernas algo más finas que la pirenaica, con diferencias en adaptación al medio montañoso.

16. En el proceso de producción de perdiz roja, una vez recolectados los huevos y antes de proceder a la incubación masiva, ¿cuáles son las condiciones óptimas de mantenimiento para garantizar la viabilidad del embrión?

- A) Mantenerlos entre 10°C y 12°C con una humedad relativa del 40%,
- B) Mantenerlos entre 15°C y 18°C con una humedad relativa del 75-80%
- C) Mantenerlos a temperatura ambiente entre 20-25°C para evitar el choque térmico, asegurando una ventilación constante para que la cáscara se endurezca.
- D) Mantenerlos en cámara frigorífica a 4°C para detener totalmente el metabolismo celular

17. En una explotación cinegética de cría en cautividad de conejo de monte, ¿cómo influye el periodo de gestación en el manejo de las instalaciones de los parques de cría o jaulones?

- A) Dado que la gestación dura 20 días, se debe limpiar y desinfectar el nido cada semana para evitar la proliferación de coccidios antes del parto.
- B) Debido a que la gestación dura aproximadamente 30 días, es fundamental colocar el material de nidificación y el acceso al nido unos 4 o 5 días antes del parto
- C) Como la gestación es de 45 días, las instalaciones deben contar con sistemas de refrigeración forzada, ya que las hembras gestantes son extremadamente sensibles al estrés térmico durante el segundo mes.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

D) El tiempo de gestación es variable (entre 15 y 50 días) dependiendo de la disponibilidad de alimento, por lo que las naves de manejo deben tener divisores móviles para ajustar el tamaño del nido.

18. ¿Qué actuación selvícola en encinares y melojares está específicamente orientada a mejorar la disponibilidad de alimento para la fauna cinegética de caza mayor?

- A) Eliminación completa del piso arbustivo.
- B) Podas de realce y desbroces selectivos.
- C) Sustitución por especies de crecimiento rápido.
- D) Incremento de la fracción de cabida cubierta al 100 %

19. ¿Cuál es el principal inconveniente ecológico de la suplementación alimenticia artificial mal planificada?

- A) Disminución de la fertilidad del suelo.
- B) Concentración excesiva de animales en puntos concretos.
- C) Reducción del valor nutritivo del alimento natural.
- D) Aumento del número de depredadores domésticos.

20. Si el cálculo de la capacidad biocinegética (K) resulta inferior al censo real y se observa una línea de ramoneo marcada, la decisión técnica más adecuada es:

- A) Autorizar la suspensión de descastes.
- B) Incrementar la suplementación alimenticia y mantener la población.
- C) Reducir la población mediante extracción controlada.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

D) Realizar un estudio intensivo del estrato herbáceo

21. ¿En la Comunidad de Madrid, durante qué meses puede cazarse la tórtola común en la temporada 2025–2026?

- A) Puede cazarse durante toda la media veda del 21 de agosto al 21 de septiembre
- B) Solo puede cazarse los sábados 30 de agosto y 6 de septiembre.
- C) Puede cazarse del 8 de octubre al 31 de enero.
- D) Puede cazarse todos los sábados de agosto y septiembre

22. En la Comunidad de Madrid ¿Cuál es el cupo máximo de becasas por cazador y día?

- A) 2 ejemplares.
- B) 3 ejemplares.
- C) 5 ejemplares.
- D) 8 ejemplares

23. En la media veda en la Comunidad de Madrid, ¿qué superficie mínima debe tener un coto privado para autorizar la caza de codorniz, paloma torcaz o estornino pinto?

- A) 100 ha
- B) 150 ha
- C) 250 ha
- D) 500 ha

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

24. ¿Qué arma está prohibida durante la actividad cinegética en la Comunidad de Madrid?

- A) Escopeta semiautomática limitada a dos cartuchos en cargador y uno en recámara.
- B) Rifle de cerrojo.
- C) Arma provista de visor para el tiro nocturno
- D) Escopeta de dos cañones.

25. ¿Cuál es el período hábil general para la caza menor en la Comunidad de Madrid para la temporada 2025-2026?

- A) Del 21 de agosto al 21 de septiembre.
- B) Del 1 de septiembre al 21 de febrero.
- C) Del 8 de octubre al 31 de enero.
- D) Del 15 de octubre al 15 de noviembre.

26. En la Comunidad de Madrid para mantener la autorización de caza de tórtola, antes del 1 de agosto de 2026 el coto debe:

- A) Realizar un censo y aplicar al menos dos medidas de mejora del hábitat.
- B) Repoblar con al menos 20 tórtolas/ha.
- C) Instalar tres bebederos artificiales/ha.
- D) Presentar un plan técnico de caza

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

27. ¿Qué actuación de gestión del hábitat resulta especialmente beneficiosa para el zorzal en los cotos de la Comunidad de Madrid por mejorar la disponibilidad de su alimento principal?

A) La creación de refugios con acumulación de piedras y restos vegetales para favorecer las poblaciones de pequeños roedores.

B) La gestión y conservación de olivares, acebuches y arbustos productores de bayas, como lentiscos y madroños.

C) La eliminación del matorral para favorecer grandes superficies de cereal.

D) Los tratamientos selvícolas orientados a crear claros y ecotonos que aumenten la diversidad florística del sotobosque.


28. La especie cinegética que se muestra a continuación es:

A) *Turdus philomelos*

B) *Turdus iliacus*

C) *Turdus viscivorus*

D) *Turdus pilaris*



29. La pluma que se muestra a continuación pertenece a la especie:

A) *Pica pica*

B) *Turdus philomelos*

C) *Coloeus monedula*

D) *Sturnus vulgaris*



DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

30. La especie cinegética que se muestra a continuación es:

- A) *Streptopelia decaocto*
- B) *Columba livia*
- C) *Columba palumbus*
- D) *Columba oenas*



31. Al comparar la morfología de las plumas y los hábitos alimenticios de la corneja negra y la grajilla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones define mejor sus diferencias?

- A) Las plumas primarias de la corneja son notablemente más largas y aunque ambas son omnívoras, la corneja tiene un hábito más necrófago y depredador, mientras que la grajilla destaca por una dieta con mayor carga vegetal, granívora e insectívora.
- B) La grajilla posee plumas primarias con el raquis blanco para distinguirse en el bando, y su alimentación es exclusivamente carnívora para compensar su menor tamaño frente a la corneja.
- C) La corneja tiene plumas primarias cortas y redondeadas porque no realiza vuelos largos, basando su dieta solo en brotes verdes, mientras que la grajilla es más carnívora.
- D) Ambas especies tienen plumas primarias idénticas en longitud, diferenciándose solo por la alimentación: la corneja es omnívora y la grajilla es granívora.

32. En relación con la ecología del hábitat y la gestión cinegética de la becada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor sus preferencias de hábitat y la implicación técnica de su caza?

- A) Prefiere zonas de matorral muy ralo y suelos pedregosos donde el mimetismo es mayor, siendo su caza puramente de espera al anochecer cuando se desplaza a zonas de cultivo.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

B) Se asienta preferentemente en bosques húmedos con suelos ricos en humus y materia orgánica, y su caza se suele realizar perros de muestra

C) Es una especie que evita estrictamente los helechales y las zonas de umbría por el exceso de humedad, prefiriendo las laderas solanas de vegetación xerófila, lo que permite una caza de mano sin necesidad de perros especializados.

D) Su hábitat óptimo son los pinares de repoblación joven sin sotobosque, donde la visibilidad para el cazador es máxima y el vuelo de la pieza es rectilíneo y previsible.

33. En relación con la peste porcina africana en el jabalí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Afecta a cérvidos

B) Es una enfermedad bacteriana de baja gravedad que no produce mortalidad significativa en poblaciones de jabalí.

C) Su transmisión afecta a los humanos por el consumo de carne afectada

D) Es una enfermedad vírica altamente contagiosa

34. El precinto digital se define técnicamente como el instrumento administrativo de control cuya función principal es:

A) Acreditar el pago de las tasas de aprovechamiento cinegético mediante un justificante electrónico descargable que debe acompañar siempre a la pieza en su transporte.

B) Sustituir la declaración anual de capturas mediante un registro fotográfico opcional que el titular del acotado envía al finalizar la temporada de caza.

C) Validar legalmente el abate de un ejemplar sujeto a cupo mediante la activación de un código alfanumérico o QR único vinculado a la autorización de caza

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

D) Identificar exclusivamente a los ejemplares destinados a la exportación de trofeos mediante un chip de radiofrecuencia (RFID) integrado en el precinto físico tradicional.

35. ¿Qué municipios componen la superficie de la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz en la Comunidad de Madrid?

- a) Buitrago, Rascafría, Lozoya y Pinilla.
- b) Montejo de la Sierra, La Hiruela, Puebla de la Sierra y El Atazar.
- c) Cercedilla, Navacerrada, Guadarrama y Alpedrete.
- d) Patones, Torrelaguna, Torremocha y El Berrueco.

36. En relación con la planificación cinegética de aves, ¿qué caracteriza a los pasos tradicionales de palomas migratorias?

- a) Son puestos fijos situados en accidentes geográficos específicos donde se aprovecha el flujo estacional de la paloma torcaz y el zorzal para darles caza
- b) Son puestos fijos situados en accidentes geográficos específicos donde se aprovecha el flujo estacional de las palomas para darles caza.
- c) Son zonas de reserva donde está estrictamente prohibido disparar para garantizar la reproducción de la especie.
- d) Son senderos habilitados exclusivamente para el turismo ornitológico y el avistamiento de aves sin armas.

37. ¿Qué se entiende por “descorreo” del corzo?

- A) La caída anual de las cuernas de los machos adultos.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

- B) El proceso de eliminación del terciopelo que recubre las cuernas recién formadas.
- C) La intensa persecución de la hembra por parte del macho durante el celo.
- D) El desplazamiento de los juveniles fuera del territorio materno.

38. Según la normativa sobre la caza de la liebre con galgo, ¿cuándo se pueden soltar hasta tres galgos en una misma carrera a una liebre?

- A) Cuando el terreno tenga más de 100 hectáreas y los galgos estén amarrados previamente.
- B) Cuando al menos uno de los galgos tenga una edad igual o inferior a once meses.
- C) Cuando la liebre ya haya sido perseguida previamente por un solo galgo.
- D) Cuando no se utilicen armas de fuego y todos los galgos sean de la misma rehala.

39. Según el Decreto 47/1991, de 21 de junio, ¿en qué terrenos es obligatoria la implantación del Plan de Aprovechamiento Cinegético (PAC)?

- A) En todos los montes públicos de la Comunidad de Madrid.
- B) En todos los terrenos acotados al efecto.
- C) Únicamente en los cotos privados de caza mayor.
- D) Solo en los terrenos gestionados por la Comunidad de Madrid

40. ¿Qué licencia de armas autoriza el uso de rifles para caza mayor?

- A) Licencia C
- B) Licencia E
- C) Licencia B

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

D) Licencia D

41. ¿Qué tipo de arma se recarga después de cada disparo mediante un mecanismo accionado manualmente por el tirador?

- A) Arma automática
- B) Arma semiautomática
- C) Arma basculante
- D) Arma de repetición

42. ¿Qué organismo establece las normas internacionales para homologar trofeos de caza?

- A) Seprona
- B) Ministerio de Agricultura
- C) Federación Española de Caza
- D) Consejo Internacional de Caza

43. ¿Qué documento acredita la titularidad de un arma de fuego?

- A) Licencia de caza
- B) El seguro de caza
- C) Tarjeta de armas
- D) Guía de pertenencia

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

44. ¿En qué lugar de la Comunidad de Madrid se realizan las homologaciones oficiales de trofeos de caza mayor?

- A) En la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
- B) En la Federación Madrileña de Caza.
- C) En el Seprona de la Guardia Civil.
- D) En el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Madrid.

45. En los terrenos administrados por la Comunidad de Madrid, ¿cuál es la única modalidad permitida para la caza de la cabra montés?

- A) Montería
- B) Batida
- C) Al salto
- D) Rececho

46. Según la normativa sobre el uso de hurones en la caza de conejos en la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) Se pueden emplear hasta cinco hurones por grupo de captura y sin límite de cazadores por grupo.
- B) Cada grupo de captura puede estar formado por un máximo de seis cazadores con escopeta y emplear hasta tres hurones.
- C) Se permite un máximo de diez cazadores por grupo de captura, sin limitación de hurones por hectárea.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

D) No existen limitaciones en el número de grupos de captura si la densidad de conejos es alta.

47. ¿Cuál es una diferencia correcta entre la caza a mano y la caza a salto?

A) En la caza a mano se utilizan perros, mientras que en la caza a salto no se permite su uso.

B) La caza a salto se realiza avanzando el cazador de forma individual o en grupos reducidos, mientras que la caza a mano implica la participación coordinada de varios cazadores en línea o formación.

C) La caza a mano solo se realiza con armas de fuego, mientras que la caza a salto es exclusivamente con hurón.

D) En la caza a mano los cazadores avanzan de forma dispersa cubriendo una zona amplia, mientras que en la caza a salto se avanza de forma más lenta y sistemática para levantar la pieza de forma individual.

48. ¿Cuál de las siguientes especies no se utiliza habitualmente en cetrería?

A) Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

B) Azor común (*Accipiter gentilis*)

C) Gavilán común (*Accipiter nisus*)

D) Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

49. ¿Cuál de las siguientes denominaciones no corresponde a una subespecie del ciervo?

A) *Cervus elaphus hispanicus*

B) *Cervus elaphus scoticus*

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

C) *Cervus elaphus hippelaphus*

D) *Cervus elaphus italicus*

50. En la valoración de trofeos de corzo (*Capreolus capreolus*), el “perlado” hace referencia principalmente a:

A) La longitud total de las cuernas medida desde la base hasta las puntas.

B) La presencia de rugosidades o relieves en la superficie de las cuernas, que aportan valor estético al trofeo.

C) El color oscuro uniforme de las cuernas debido a la edad del animal.

D) La separación entre las dos cuernas en la roseta basal.

51. ¿Cuál de los siguientes documentos no forma parte de la documentación obligatoria que debe portar un cazador para cazar con armas en la Comunidad de Madrid?

A) Licencia de caza en vigor

B) Póliza del seguro de caza

C) Autorización del titular del coto, cuando proceda

D) Carné acreditativo de pertenencia del socio del coto

52. En la gestión de poblaciones de ciervo se define como "primala" a aquella hembra que:

A) Ha alcanzado la madurez sexual pero todavía no ha tenido su primera cría.

B) Ha parido por primera vez y se encuentra amamantando a su primer cervato (clase de edad II).

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

C) No ha alcanzado el peso crítico y, por tanto, es incapaz de ovular a pesar de haber superado el año de vida.

D) Ha sido rechazada por la madre tras el destete pero todavía no ha mudado la dentición de leche a la definitiva.

53. En la gestión cinegética, ¿qué criterio principal se utiliza para diferenciar legalmente entre especies de Caza Mayor y Caza Menor?

- A) La peligrosidad de la especie durante su captura.
- B) El tamaño de la especie, tomando al zorro como límite superior de la caza menor.
- C) El tipo de hábitat donde reside el animal (bosque o campo abierto).
- D) Si la especie es ungulada o carnívora.

54. ¿Qué número de Real Decreto aprobó el Reglamento de Armas que regula la categorización de las armas de fuego en España?

- a) Real Decreto 137/1993
- b) Real Decreto 248/2016
- c) Real Decreto 976/2011
- d) Real Decreto 170/2020

55. Según la normativa de señalización de cotos privados de caza en la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Las tablillas de primer orden se colocan cada 100 metros y las de segundo orden cada 600 metros.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

B) Las tablillas de primer orden se colocan cada 600 metros y las de segundo orden cada 100 metros.

C) Las tablillas de primer orden se colocan cada 100 metros como máximo, mientras que las de segundo orden se intercalan entre las anteriores con una separación máxima de 600 metros respecto a las de primer orden.

D) Las tablillas de segundo orden se colocan únicamente en accesos principales del coto, siempre con una separación mínima de 100 metros entre ellas.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
Apellidos:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

PLANTILLA PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS:

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D

29	A	B	C	D
30	A	B	C	D
31	A	B	C	D
32	A	B	C	D
33	A	B	C	D
34	A	B	C	D
35	A	B	C	D
36	A	B	C	D
37	A	B	C	D
38	A	B	C	D
39	A	B	C	D
40	A	B	C	D
41	A	B	C	D
42	A	B	C	D
43	A	B	C	D
44	A	B	C	D
45	A	B	C	D
46	A	B	C	D
47	A	B	C	D
48	A	B	C	D
49	A	B	C	D
50	A	B	C	D
51	A	B	C	D
52	A	B	C	D
53	A	B	C	D
54	A	B	C	D
55	A	B	C	D