

# 2026

|                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Insecto del mes | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
|                 | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |

## Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)



|       | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HUEVO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| NINFA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| IMAGO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



### ¿Cómo es?

*Scantius aegyptius* es un heteróptero pequeño, que mide entre 8 y 10 milímetros. con cuerpo elipsoidal y aplanado, combinando los característicos colores aposemáticos naranja y negro. La cabeza triangular, las patas y las antenas son negras. Los ojos tienen color caoba. El pronoto es naranja con una ancha mancha interior negra. El escudete es un triángulo equilátero negro. El conexivo es completamente naranja, mientras que el abdomen por debajo combina naranja y negro.

### ¿Dónde podemos encontrarlo?

Nativo de la región mediterránea, donde aparece tanto en toda la zona europea como en la africana y en todas las islas mediterráneas. En Europa central escasea. También en Canarias y Madeira. Por el este ocupa Oriente Próximo y Medio, Transcaucasia, Asia central y alcanza Pakistán. También alóctona, como invasora, se ha introducido en otros lugares como Norteamérica (California y Arizona, en U.S.A., y en algunos puntos de Canadá). Bastante extendido en la península ibérica, aunque falta en el noroeste y varias comunidades y provincias del norte y tampoco está citado de algunas provincias españolas y portuguesas del oeste y otras del sur como Córdoba, Jaén, Albacete y Tarragona, seguramente por falta de prospecciones. En la Comunidad de Madrid sólo en ambientes secos. En el Parque Regional del Sureste es muy frecuente, en especial en ambientes urbanos o periurbanos.

Se conocen dos subespecies, la nominal y *Scantius aegyptius rossii* Carapezza, Kerzhner & Rieger, 1999, ambas presentes en la península ibérica, pero que solamente se pueden distinguir por examen de la genitalia.

### ¿Cómo vive?

Este insecto, de la familia Pyrrhocoridae, es omnívora y polífaga, aunque se alimenta principalmente de semillas de malváceas (*Malva*, *Lavatera*, *Althaea*, *Hibiscus*) y tilos (*Tilia*), aparece en muchas otras plantas como pistachos, judías, base de los grandes cardos del género *Onopordum*, *Ecballium elaterium*, etc., aunque nunca supone una plaga para los cultivos. Devora también los huevos de otros insectos e insectos muertos (e incluso a veces vivos). Este hemíptero, de comportamiento gregario, aparece muchas veces en grupos de decenas o cientos de individuos. Hiberna como adulto bajo las piedras, entre la hojarasca o entre las grietas o bajo la corteza de los árboles.

### ¿Cuál es su hábitat?

Especie termófila y xerófila que vive en ambientes secos e incluso desérticos (Desierto de Tabernas, en Almería). Esta especie se adapta muy bien a medios alterados en zonas periurbanas y urbanas: solares, prados secos parques, descampados, etc.

### ¿Grado de protección?

La denominada *chinche roja mediterránea* carece de protección porque no la necesita. No existen amenazas para esta especie, dado los ecosistemas que ocupa habitualmente; solamente los pesticidas empleados a veces en los tratamientos urbanos de parques y jardines pueden perjudicarla.

### ¿Sabías que?

La superfamilia Pyrrhocoroidea comprende más de 400 especies, encuadradas en 65 géneros repartidos en todo el mundo. (o 340 especies en 33 géneros, según otros). Son de distribución mundial, más diversos en los trópicos y subtropicos. En la península ibérica viven dos especies: la que nos ocupa y *Pyrrhocoris apterus*, que también es muy común y tiene comportamientos y hábitos similares. Los miembros de la familia Pyrrhocoridae, se confunden a menudo con los ligeidos, pero se pueden separar fácilmente por la falta de ocelos (ojos simples) en la parte superior de la cabeza. Miden hasta 30 mm. La mayoría son rojos y negros. *Scantius aegyptius* se suele confundir con la otra especie ibérica, *Pyrrhocoris apterus*, pero este último carece casi siempre de alas (de ahí su nombre) y los hemiélitros tienen dos puntos negros.

Su llamativo color naranja o rojo y negro es una estrategia defensiva llamada aposematismo, que utilizan para advertir a los depredadores, como lo podrían ser los pájaros, de que tienen muy mal sabor, aunque no sean tóxicas.



Parque Regional  
del Sureste

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Insectos