

2026

Mariposa del mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Aporophyla (Phylapora) canescens (Duponchel, 1826)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO												
ORUGA												
CRISÁLIDA												
IMAGO												

¿Cómo es?

Aporophyla canescens es una mariposa de tamaño medio, con una envergadura alar de 40 a 45 milímetros. Presenta una coloración críptica de base blanquecina y una serie de líneas zigzagueantes transversales oscuras y puntos oscuros alineados transversalmente, además de multitud de diminutos puntos oscuros salpicando toda la superficie del anverso de las alas anteriores y la pilosidad del dorso del tórax. El patrón de líneas y áreas ensombrecidas es poco variable. Las alas posteriores son blanquecinas en los machos y grisáceas en las hembras.

La oruga es negra, con rayas blancas en vista lateral y extremidades verdes.

¿Dónde podemos encontrarla?

Aporophyla canescens es una especie asiático-supramediterránea de amplia distribución que llega hasta el sur de Rusia y Ucrania por el este. Se encuentra en Portugal, España, Francia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, Suiza, Italia, Eslovenia, Croacia, Albania, Bosnia y Hercegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Grecia, Turquía, Israel, Chipre y Creta. En España no es frecuente pero su área de distribución es muy amplia y ocupa casi todo el territorio. En la Comunidad de Madrid tampoco es abundante, pero está extendida. En el Parque Regional del Sureste aparece al menos en San Fernando de Henares (Soto de Aldovea), Torrejón de Ardoz, Rivas-Vaciamadrid y Aranjuez.

¿Sabías que?

Como otros noctuidos, es atraída por las luces durante la noche. Muchas de las denominadas falenas o polillas, y ésta también, muestran libreas apagadas, parduzcas o sin coloraciones llamativas para pasar desapercibidas en el entorno y escapar de esa manera a los eventuales depredadores.

Son varias las características que hacen de las mariposas nocturnas un grupo zoológico muy valioso a la par que poco conocido y valorado. Entre ellas destacar que están en la base de la cadena trófica zoológica, por lo que su desaparición supondría una merma importante del número de aves insectívoras, murciélagos, pequeños reptiles y de otros insectos. Sin ellos el control natural de las plagas sería mucho menos efectivo. Por otra parte, son indicadores biológicos de extrema importancia porque nos informan de la salud ambiental del territorio, de los cambios existentes a nivel climático, siendo testigos vivos de la recuperación de la vegetación tras los incendios y quemas.

El género *Aporophyla* fue establecido en 1841 por Achille Guenée (Chartres, 1 de enero de 1809 - Châteaudun, 30 de diciembre de 1880), abogado y entomólogo francés de prestigio, especialista en la familia Noctuidae. Achille fue autor de 63 publicaciones científicas, algunas de ellas en colaboración con P.A.J. Duponchel.

¿Cuál es su hábitat?

Esta mariposa, de la familia Noctuidae, tiene marcada preferencia por el bosque mediterráneo y el matorral bajo de ambiente seco. Encinares aclarados y pastizales donde se encuentran diversos táxones que se corresponden con sus plantas huésped.

¿Cuáles son sus plantas nutricias?

La oruga de *Aporophyla canescens* se alimenta de las hojas de las plantas de los géneros *Asphodelus*, *Narcissus* y *Calendula*.

¿Grado de protección?

Aporophyla canescens carece de protección porque no la necesita. Los factores de riesgo para su supervivencia son la pérdida de hábitat y los causados por los biocidas empleados en la agricultura. También podría ser cuantitativamente importante la pérdida de efectivos a causa de la contaminación lumínica, aunque no existen estudios científicos específicos que demuestren tal suposición.