

2026

Planta
del mes

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC.



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												



¿Cómo es?

Asterolinon linum-stellatum es una hierba diminuta de color verde claro y ciclo anual, que mide entre 3 y 15 centímetros. **Raíz** de hasta 5 cm, muy fina. **Tallos** simples o ramificados justo por encima de la base o en la mitad superior, angulosos. Las **hojas** tienen forma de punta de lanza, son muy agudas, sentadas, de 3-10,5 x 0,7-2,8 mm, lanceoladas, enteras, glandulosas, más largas que los entrenudos; pedicelos de 2-3 (-3,5) mm. **Flores** pequeñas, con pedicelo filiforme, generalmente más corto que las hojas, situadas en las axilas de las hojas, con sépalos muy agudos que se abren formando la imagen de una estrella. Lóbulos del cáliz de 1,8-3,5x 0,4-1 mm, lanceolados. Corola de 0,2-0,8 (-1,4) mm. El **Fruto** es una pequeña cápsula de 1,5-2 mm, globosa, brillante, que contiene de 2 a 5 semillas de 1,2 mm.

¿Cuál es su hábitat?

Esta hierba diminuta, de ciclo anual, es muy frecuente en los prados terofíticos (ricos en plantas anuales). Pastizales y prados efímeros, también en zonas de matorral bajo pinos. Aparece en los pisos termo, meso y supramediterráneo, hasta los 1.250 metros de altitud. Indiferente edáfico, aparece incluso en terrenos arenosos y los yesíferos. *Asterolinon linum-stellatum* es una de las especies representativas de los pastizales xerofíticos mediterráneos, generalmente abiertos, integrados por gramíneas anuales y vivaces, así como por otros terofitos, hemicriptófitos y geófitos. Así pues, se asocia a especies como *Avenula bromoides*, *Bellis annua*, *Brachypodium distachyon*, *Brachypodium retusum*, *Dactylis glomerata*, *Dipcadi serotinum*, *Erophila verna*, *Koeleria castellana*, *Linum strictum*, *Lygeum spartum*, *Poa bulbosa*, *Sedum gypsicola*, *Stipa parviflora*, *Stipa offneri*, *Stipa tenacissima*, *Teucrium pseudochamaepitys* y *Thapsia villosa*. Estos pastizales se asientan en general sobre sustratos calcáreos medianamente profundos e incluso superficialmente cascajosos, como mucho con hidromorfía muy temporal; en ocasiones en suelos ricos en yeso, como sucede con frecuencia en bastantes terrenos de los municipios del PRS, y a veces en pastizales perennes, especialmente de esparto, que se encuentran salpicados de pinos carrascos, lo que podría conducir a pensar erróneamente en un hábitat de bosques abiertos. El tipo de sustrato, así como la profundidad del mismo, junto con las condiciones xéricas de las zonas donde se presentan, son los principales factores abióticos que determinan la existencia de este tipo de hábitat.

¿Sabías que?

A diferencia de otras plantas de la familia Primulaceae, no se destacan usos medicinales, alimenticios o industriales documentados. Su valor es fundamentalmente botánico, paisajístico (a pequeña escala) y ecológico; en efecto, esta plantita está valorada principalmente por su papel ecológico en pastizales secos y zonas ruderalizadas.

Carlos Linneo dio el nombre de *Lysimachia linum-stellatum* a esta especie. Posteriormente, fue asignada al género *Asterolinon* Hoffmanns. & Link. por Duby en DC. Georges Duby (París, 7 de octubre de 1919 – Le Tholonet, Provenza-Alpes-Costa Azul, 3 de diciembre de 1996) fue un historiador francés especializado en historia social e historia de las mentalidades de la Edad Media. Se encuentra entre los medievalistas más influyentes del siglo XX, siendo uno de los más prominentes intelectuales franceses en la década de 1970 hasta su muerte. Nacido en una familia de artesanos provenzales que vivían en París, fue inicialmente educado en el campo de la geografía histórica antes de entrar a especializarse en historia. Obtuvo una licenciatura en Lyon en 1942 y completó su tesis de postgrado en la Sorbona. Nombrado presidente de la Sociedad de Historia Medieval en el Collège de France en 1970. Fue elegido miembro de la Académie française en 1987.

Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, también conocido por su abreviación botánica estándar “Prodr. (DC.)”, es un tratado de 17 volúmenes de Botánica iniciado por A.P. de Candolle, quien lo concibió como un compendio de todas las plantas conocidas, que incluía taxonomía, ecología, evolución y biogeografía. Como autor, pudo completar, de 1824 a 1839, siete volúmenes, de 1824 a 1839, hasta que falleció en 1841; su hijo, Alphonse de Candolle, asumió la responsabilidad de continuarla, editando diez volúmenes adicionales, con contribuciones de un grupo de autores, entre los que se encontraba G. Duby.

¿Dónde podemos encontrarla?

Se distribuye por la región mediterránea e islas Canarias. Habita la práctica totalidad de la Península Ibérica, a excepción de las altitudes superiores a los 1.250 metros; también en Baleares. En la Comunidad de Madrid también muy repartida, salvo por encima de la altitud indicada. Presente en todo el Parque Regional del Sureste, donde abunda.

¿Grado de protección?

El lino de lagartijas, que pertenece a la familia Primulaceae, está catalogado como “Preocupación menor” (LC) en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. El factor de riesgo más importante para su supervivencia es, sin duda alguna, la pérdida de hábitat.



Parque Regional
del Sureste

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Flora