

2026

Mariposa del mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO												
ORUGA												
CRISÁLIDA												
IMAGO												

¿Cómo es?

Caradrina clavipalpis es una mariposa de tamaño medio, con una envergadura alar entre 26 y 35 milímetros. Ala anterior de coloración gris pálido a gris oscuro con un moteado más oscuro y a veces con un tinte ocre; el área terminal generalmente fusco; las líneas comienzan desde manchas costales negras; la interna y la externa dobles, negruzcas, la interna diminutamente ondulada, la externa dentada; línea subterminal pálida, ondulada, precedida por una sombra gris con marcas rojizas dentadas en ella; estigmas pequeños, fusco, el orbicular redondeado, el reniforme una lúnula estrecha, con dos puntos blancos en su borde interno y tres en el externo; ala posterior blanca, las venas y termen gris oscuro — en *laciniosa* Donz. la línea subterminal consiste en una hilera de 3 manchas amarillentas cada una extendida hasta termen; — la forma *leucoptera* Thnbg., de Escandinavia, Finlandia y los montes Urales, tiene una sufusión oscura sobre la cabeza, el tórax y el ala anterior.

¿Dónde podemos encontrarla?

Se encuentra en la región paleártica. Coloniza Europa, todo el norte de África y Macaronesia, Kuwait, Irak, Irán, Rusia, Asia Central, Mongolia, Afganistán, Pakistán, el noroeste de la India y Sri Lanka. Introducida en Norteamérica, donde se registró por primera vez en Queens, Nueva York, en 1993. En la península ibérica está muy extendida; también en la Comunidad de Madrid. En el Parque Regional del Sureste, es frecuente por todas partes.

¿Sabías que?

Este noctuido, en nuestras latitudes, tiene una sola generación anual (en Norteamérica tiene dos). Como otros muchos noctuidos, esta especie vuela de noche y es atraída por la luz, y como ellos, forma una parte importante de la dieta de ciertos depredadores, entre los que destacan los murciélagos. Referido a éstos últimos, hay que resaltar que, aunque la teoría ecológica postula que los nichos de especies coexistentes deben diferir en ciertas dimensiones ecológicas para permitir su coexistencia estable, muchos sistemas biológicos desafían este principio de exclusión competitiva. Los murciélagos insectívoros del hemisferio norte suelen formar agrupaciones locales de múltiples especies que comparten rasgos funcionales muy similares y pertenecen a gremios tróficos idénticos. Aunque su nicho trófico puede estudiarse con un nivel de detalle sin precedentes mediante la identificación genética de presas, los mecanismos subyacentes de partición de recursos siguen estando en gran medida inexplorados. En este complejo asunto planteado, y circunscribiéndonos a España, hay que resaltar que la especie que nos ocupa tiene gran valor debido a su abundancia y a que ocupa prácticamente todos los ecosistemas.

La especie fue descrita por el naturalista austriaco-italiano Giovanni Antonio Scopoli (Cavales, Tirol, 13 de junio de 1723 — Pavía, 8 de mayo de 1788). Scopoli fue médico en Idra y acumuló material de la flora de Carniola, que publicó en 1760, y una fauna entomológica de la misma región que se publicó en 1763. En 1777, obtuvo la cátedra de Historia Natural de la Universidad de Pavia. Su principal trabajo es *Introductio ad historiam naturalem*. Fue el primer entomólogo que tuvo la idea de dedicar los insectos y arácnidos que describió a personas y que, en su *Entomologia Carniolica*, tienen el nombre específico de algunos naturalistas.

¿Cuál es su hábitat?

Esta especie, que pertenece a la familia Noctuidae, aparece en cualquier tipo de hábitat, dado que sus plantas-huésped son muy abundantes por todas partes.

¿Cuáles son sus plantas nutricias?

Las orugas de *Caradrina clavipalpis* se alimentan de especies del género *Plantago* y diversas gramíneas.

¿Grado de protección?

La denominada *sauce moteada pálida* carece de protección porque no la necesita. En realidad, no se han detectado factores de riesgo para su supervivencia, salvo, localmente, el empleo masivo de biocidas. Puede verse afectada, como muchas otras especies de mariposas nocturnas, por la contaminación lumínica, aunque en el caso de *Caradrina clavipalpis* tampoco parece ser un factor relevante.