

2026

Insecto
del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO												
NINFA												
IMAGO												

¿Cómo es?

Eumodicogryllus bordigalensis es un pequeño grillo que mide entre 11 y 14 milímetros cuyo color va desde ocre y diferentes tonos de marrón hasta casi negro. Cabeza con una franja clara entre los ojos y líneas longitudinales oscuras. Las alas sobresalen por detrás del cuerpo. El ovipositor es de 6-7 mm, muy delgado y recto.

¿Dónde podemos encontrarlo?

Se distribuye por el sur y este de Europa (sur de Polonia, etc), norte de África y, por el este, llega hasta el Cáucaso, Azerbaiján, Kazajistán, Rusia central y suroccidental, Ucrania, China (Gansu, Qinghai y Xingianj), Mongolia interior (territorio autónomo de la República Popular China, colindando con Mongolia) y sur de Pakistán. Presente en las Islas Canarias y en las Azores. Extendido por toda la península ibérica. En la Comunidad de Madrid y en el Parque Regional del Sureste es frecuente.

¿Cuál es su hábitat?

Vive en los campos y eriales, en zonas de matorral, y también en jardines urbanos, solares, etc.

¿Sabías que?

Los adultos vuelan bien y son atraídos por las luces durante la noche. Por eso mismo, es habitual que aparezcan en los edificios y se les suele encontrar en cocinas, sótanos, cobertizos y en cualquier parte de las casas.

Muy parecido al grillo doméstico, *Acheta domesticus* (Linnaeus, 1758), con el cual se puede confundir si no se observa con cuidado, aunque se distingue bien por varios caracteres. El primero es que ambas especies difieren en tamaño; mientras que el adulto de *A. domesticus* mide entre 16 y 20 mm, el de *E. bordigalensis* mide de 11 a 14 mm. La segunda diferencia es que *E. bordigalensis* tiene las tibias posteriores con cinco espinas en cada lado, fácil de apreciar con el grillo en la mano. Otra diferencia se encuentra en la parte frontal de la cabeza. *E. bordigalensis* tiene la línea cíleo-frontal angulosa; en el caso de *A. domesticus* esa línea es redondeada. Otra diferencia está en la parte dorsal de la cabeza de *E. bordigalensis* sobre la cual se pueden ver 5 bandas oscuras longitudinales y dos transversales.

¿Cómo vive?

Se trata de una especie cuya actividad es mayoritariamente nocturna y crepuscular, manteniéndose oculta durante el día. Muestran predilección por temperaturas elevadas y zonas oscuras para refugiarse.

Eumodicogryllus bordigalensis es un insecto omnívoro, que se alimenta de material vegetal y pequeños insectos, que puede devorar a miembros más débiles de su especie cuando escasea el alimento.

Es una especie sociable y menos territorial que el grillo campestre, Los adultos se hacen notar especialmente en verano, que es cuando se emparejan y se escucha su canto, muy potente, que es un chirrido melodioso, más variado que el canto de los grillos de campo, de 2 a 4 chirridos/seg.

¿Grado de protección?

Eumodicogryllus bordigalensis, denominado grillo de Burdeos, ortóptero de la familia Gryllidae, carece de protección porque no la necesita. El factor de riesgo más importante para su supervivencia es la muerte producida por los pesticidas y, en su caso, la pérdida de hábitat.



Parque Regional
del Sureste

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Insectos