

2026

Planta
del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Scandix australis L.



Parque Regional
del Sureste

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Flora



¿Dónde podemos encontrarla?

Especie ampliamente dispersa por el área mediterránea, en ambos continentes; oeste de Asia. Habita la mayor parte de la península ibérica, aunque es más abundante en el centro y sur; también en Baleares. En la Comunidad de Madrid está muy extendida y solamente falta en el norte. Presente en todo el Parque Regional del Sureste.

¿Grado de protección?

La planta denominada *agujas de pastor*, que pertenece a la familia Apiaceae, carece de protección porque no la necesita. La mayor amenaza para la especie es la pérdida de hábitat.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

¿Cómo es?

Scandix australis es una hierba anual que mide entre 3 y 40 centímetros. **Hojas** 2 – 3 pinnatisectas, teniendo las divisiones de último orden estrechas, lineares o lanceoladas y con un margen ciliado; su vaina apenas está desarrollada. Las **flores** se disponen en inflorescencias de tipo umbela, compuestas o simples, dispuestas en las axilas de las hojas y con 1 o 2 radios que carecen de brácteas; umbelas con 1-2(4) radios; las umbélulas con (1)3-15 flores, radiadas, con bractéolas no divididas, bífidas, laciniadas o pinnatisectas. Las flores hermafroditas y en ocasiones masculinas. El cáliz tiene dientes muy reducidos, y la corola pétalos blancos, los externos mayores, obovados. El androceo tiene filamentos de los estambres blancos, anteras amarillas, verdes o púrpuras. El **fruto** de hasta 35 mm, el central sentado o casi, cilíndrico o subcilíndrico, hispido, escábrido, y con un pico muy desarrollado, hasta 7 veces la longitud semiínfera; los mericarpos tienen las 5 costillas igualmente marcada, con pitas no aparentes o una en cada valécula y 2 en la cara comisural.

¿Cuál es su hábitat?

Es una planta que aparece en pastos y claros de matorral termófilo; en prados terofíticos, repisas y pies de cantil; también en herbazales en suelos nitrogenados en ambiente seco y soleado (así se ha detectado en Rivas-Vaciamadrid). Habitualmente poco gregaria; se suelen localizar individuos aislados o pequeñas poblaciones de hasta algunas decenas de ejemplares. Indiferente edáfica. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1.600 metros de altitud.

¿Sabías que?

Scandix australis es una planta de olor y sabor anisado, conocida popularmente como “anís silvestre”, que se ha utilizado tradicionalmente en algunas regiones de España por sus propiedades digestivas y carminativas. Se consumía para aliviar dolores de estómago, cólicos y malestar general. Ayuda a reducir los gases y la hinchazón abdominal.

Debido a su contenido de trans-Anetol, que le otorga un característico sabor y olor a anís, la planta se ha empleado cruda, cocida como verdura o macerada en aguardiente, para elaborar licores estomacales y bebidas refrescantes.

El trans-Anetol es un compuesto orgánico natural responsable del característico olor y sabor a anís o regaliz presente en plantas como el anís estrellado, el hinojo y el anís verde. Su fórmula química es $C_{10}H_{12}O$; su aspecto es el de un líquido incoloro o amarillo pálido con aroma dulce; insoluble en agua pero soluble en alcohol (etanol) y otros disolventes orgánicos; es el isómero más estable y común del anetol (en comparación con el cis-anetol, que es menos estable).