



**RED de
OBSERVATORIOS
de FAUNA**



Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid



**Comunidad
de Madrid**

Índice

1. Presentación
2. Contexto y justificación
 - 2.1. La biodiversidad madrileña como activo estratégico
 - 2.2. Auge de la observación de fauna
 - 2.3. Necesidad de una red estructurada
3. Visión estratégica del proyecto
4. Objetivos de la red
 - 4.1. Objetivos ambientales
 - 4.2. Objetivos sociales y educativos
 - 4.3. Objetivos económicos y territoriales
5. Configuración de la red
6. Metodología de trabajo
7. Tipologías de observatorios según el hábitat de observación
 - 7.1. Humedales y ecosistemas acuáticos
 - 7.2. Ecosistemas forestales y de montaña
 - 7.3. Medios agrícolas y pseudoestepas
 - 7.4. Observatorios de anfibios y reptiles
 - 7.5. Observatorios urbanos y periurbanos
 - 7.6. Observatorios de especies singulares
8. Uso responsable y conservación
9. Coordinación con ayuntamientos
10. Impacto territorial y desarrollo rural
11. Beneficios del proyecto
12. Conclusiones
13. Mensajes clave finales
14. Enclaves actuales de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid
15. Situación actual de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid
16. Fichas de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid

01 | Presentación

La Comunidad de Madrid alberga una extraordinaria diversidad de ecosistemas y especies que convierten nuestro territorio en uno de los espacios más ricos para la observación de fauna del centro peninsular. La presencia de humedales, ecosistemas forestales, medios agrícolas, sistemas montañosos y espacios periurbanos genera una elevada variedad de hábitats que sostienen una fauna singular y diversa.



Foto 1- Paisaje dinámico en mosaico de cultivos agrícolas, clave para la conservación de la biodiversidad asociada a estos ecosistemas.

En este contexto, la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid surge como una iniciativa estratégica destinada a estructurar, mejorar y ampliar la oferta de observación de fauna en la región, integrando conservación, educación ambiental, uso público responsable y desarrollo territorial sostenible.

Más allá de la instalación de infraestructuras, el proyecto representa una nueva forma de conectar ciudadanía y naturaleza, fomentando el conocimiento del territorio y generando oportunidades para el medio rural.



49%

del territorio madrileño
cuenta con algún grado
de protección ambiental

60 enclaves

integran inicialmente la Red
de Observatorios de Fauna
de la Comunidad de Madrid

+50 especies
destacadas

de aves, mamíferos,
anfibios y otras especies
de fauna silvestre

Cifras clave de la red

6 tipologías de
observatorios

Humedales, forestales y de montaña,
agrícolas y pseudoestepas, anfibios,
urbanos y periurbanos, especies singulares

**Primera red
autonómica**

que conecta conservación,
biodiversidad, educación ambiental,
turismo de naturaleza y desarrollo rural

02 Contexto y justificación

2.1 La biodiversidad madrileña como activo estratégico

La Comunidad de Madrid concentra una gran diversidad biológica gracias a la coexistencia de ecosistemas muy distintos en un territorio relativamente reducido. **Algo más del 49% del territorio regional cuenta con alguna figura de protección ambiental**, lo que refleja la extraordinaria riqueza natural y el elevado valor ecológico de la región.

Esta riqueza natural convierte a Madrid en un territorio especialmente atractivo para:

- Observación de fauna.
- Fotografía de naturaleza.
- Educación ambiental.
- Turismo de naturaleza.
- Interpretación del paisaje.
- Divulgación científica.




Foto 2 – Observatorio en la Laguna de Soto de las Cuevas

2.2 Auge de la observación de fauna

En las últimas décadas la observación de fauna se ha consolidado como una actividad turística y recreativa en crecimiento constante, tanto a nivel nacional como internacional. El interés social por la naturaleza, la fotografía de fauna y el ecoturismo ha generado nuevas oportunidades ligadas al medio natural.

Sin embargo, esta demanda creciente también hace necesaria una adecuada planificación que:

- **Ordene el uso público.**
- **Reduzca molestias sobre especies sensibles.**
- **Mejore la experiencia del visitante.**
- **Garantice la compatibilidad entre la observación y la conservación.**

2.3 Necesidad de una red estructurada

Actualmente existen numerosos observatorios dispersos por el territorio, especialmente ligados a humedales, pero presentan importantes limitaciones:

- **Falta de identidad común.**
- **Accesos desiguales.**
- **Escasa representatividad de hábitats y especies.**
- **Insuficiente información interpretativa.**



Foto 3 - Garza imperial (*Ardea purpurea*)

03 Visión estratégica del proyecto



Foto 4- Bosque mediterráneo

La red estará formada por observatorios, puntos de observación e itinerarios faunísticos que permitan disfrutar de una amplia variedad de hábitat y especies de fauna en cada época del año.

EJES ESTRATÉGICOS

Conservación de la biodiversidad

Favorecer la protección de especies y hábitats mediante una observación ordenada y responsable.

Educación y sensibilización

Acercar la naturaleza a la ciudadanía fomentando el conocimiento y el respeto ambiental.

Desarrollo rural

Generar actividad económica en el medio rural compatible con la conservación de la naturaleza.

Observación sostenible

Canalizar el interés que suscita la observación de fauna hacia espacios acondicionados y compatibles con su conservación.

Identidad regional

Crear una red reconocible a nivel nacional e internacional y homogénea en toda la Comunidad de Madrid.

04 | Objetivos de la red

4.1 Objetivos ambientales

- Conservar la flora y fauna silvestre.
- Reducir impactos derivados del acceso desordenado a la naturaleza.
- Diversificar las especies y los hábitats a observar.
- Poner en valor hábitats naturales singulares y paisajes culturales creados como consecuencia de usos ancestrales que han modelado el paisaje madrileño.
- Reforzar la cultura de conservación.



Foto 5 – Laguna de Soto de las Cuevas

4.2 Objetivos sociales y educativos

La red busca convertir la observación de fauna en una herramienta de educación ambiental disponible para toda la ciudadanía:

- Escolares.
- Familias.
- Fotógrafos.
- Visitantes.
- Aficionados a la ornitología.
- Investigadores.

El proyecto pretende fomentar una relación más cercana y ordenada con la naturaleza y mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad madrileña.

4.3**Objetivos
económicos y territoriales**

La red se concibe como una herramienta para impulsar el desarrollo del medio rural, generando oportunidades económicas vinculadas al patrimonio natural y contribuyendo a la dinamización de nuestros municipios.

- Turismo sostenible.
- Actividad hostelera.
- Restauración y gastronomía local.
- Guías especializados.
- Comercio local.
- Valorización del territorio.

La red ayuda además a reforzar el vínculo entre conservación y mantenimiento de los paisajes culturales tradicionales.



Foto 6 – Dehesas de piedemonte

05 Configuración de la red



Foto 7 – Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*)

La red cuenta actualmente con 60 enclaves distribuidos por toda la Comunidad de Madrid, con previsión de ampliación progresiva.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA RED

Observatorios existentes

Infraestructuras ya consolidadas que serán integradas y mejoradas donde sea necesario.

Nuevos puntos de observación

Nuevos puntos estratégicos de observación, que pueden consistir en nuevos observatorios o puntos de observación sin infraestructura asociada.

Itinerarios faunísticos

Recorridos interpretativos para observación dinámica.

Señalética común

Imagen homogénea y reconocible.

Infraestructuras adaptadas

Elementos diseñados para minimizar molestias a la fauna.

Recursos digitales

Información accesible desde la web regional y materiales divulgativos.

06 Metodología de trabajo

Inventario territorial

La Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal ha desarrollado un análisis territorial basado en:

- Identificación y diversificación de hábitats.
- Identificación de especies observables y periodos de observación.
- Facilidad de acceso.
- Conexión con los municipios.
- Potencial interpretativo.

Selección de enclaves

Los puntos seleccionados responden a criterios de:

- Interés faunístico.
- Diversidad ecológica.
- Representatividad territorial.
- Compatibilidad ambiental.
- Contribución al desarrollo local.
- Potencial divulgativo.

Diseño de infraestructuras

Las infraestructuras se plantean bajo criterios de:

- Integración paisajística.
- Bajo impacto.
- Facilidad de acceso.
- Durabilidad.
- Minimización de molestias a la fauna.




Foto 8 – Bosque de frondosas asociado a la observación de especies propias de ecosistemas forestales y de montaña

07 Tipologías de observatorios según el hábitat de observación

7.1 Humedales y ecosistemas acuáticos

Los humedales y zonas húmedas constituyen los espacios más valiosos para la observación de avifauna acuática en la Comunidad de Madrid.

La mayor parte de los observatorios existentes están vinculados a estos ecosistemas.

Valores principales

- Migración, reproducción e invernada.
- Aves acuáticas.
- Biodiversidad ligada al agua.
- Ecosistemas sensibles.

Estos observatorios permiten capturar información clave para el seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas y anticipar los efectos de amenazas como el cambio climático o la alteración de los hábitats.




Foto 9 - Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*)

Especies emblemáticas



Oxyura leucocephala

Malvasía cabeciblanca

Eurasian Teal

Marmaronetta angustirostris

Cerceta pardilla

Marbled Duck



Ardea purpurea

Garza imperial

Purple Heron

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero occidental

Western Marsh Harrier



Ixobrychus minutus

Avetorillo común

Little Bittern

7.2 Ecosistemas forestales y de montaña

Los sistemas forestales y montañosos albergan algunas de las especies más emblemáticas de la fauna ibérica.

Experiencias asociadas

- Observación de rapaces.
- Buitreras.
- Mamíferos.
- Berrea.

Estos espacios permiten interpretar la complejidad ecológica de los bosques mediterráneos y de montaña, donde la estructura del arbolado, la presencia de cortados rocosos y la diversidad de microhábitats favorecen la coexistencia de una fauna rica y especializada.



Foto 10 - Cabra montés (*Capra pyrenaica*)

Especies destacadas



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica

Spanish Imperial Eagle

Aegypius monachus
Buitre negro

Cinereous Vulture



Milvus milvus
Milano real
Red Kite

Cervus elaphus
Ciervo rojo
Red Deer



Capra pyrenaica
Cabra montés
Iberian ibex

Capreolus capreolus
Corzo
European Roe Deer



7.3 Medios agrícolas y pseudoestepas

Los sistemas agrícolas sostienen el desarrollo de un interesante grupo de especies muy desconocido para gran parte de la población. Las llamadas aves esteparias son las aves más amenazadas de Europa.

Temáticas interpretativas

- Agricultura tradicional.
- Biodiversidad ligada a cultivos agrícolas.
- Amenazas sobre aves esteparias.
- Compatibilidad entre actividad agraria y conservación.

La red contribuye a visibilizar un ecosistema poco conocido pero de gran importancia para la supervivencia de un modo de vida tradicional que crea paisajes culturales, vitales para las aves esteparias, pero también para mantener vivo nuestro medio rural.

Especies destacadas



Tetrax tetrax

Sisón común

Little bustard

Otis tarda

Avutarda euroasiática

Great Bustard



Burhinus oediconemus

Alcaraván común

Eurasian Stone-curlew

Coturnix coturnix

Codorniz común

Common Quail



Foto 11 - Avutarda euroasiática (*Otis tarda*)

7.4 Observatorios de anfibios y reptiles

Los anfibios constituyen excelentes bioindicadores del estado ecológico de los ecosistemas acuáticos. La inclusión de observatorios asociados a pequeños humedales contribuye a fomentar la sensibilización sobre un grupo faunístico que, pese a su relevancia ecológica, suele pasar desapercibido.

El galápago leproso es uno de los reptiles acuáticos más emblemáticos de los humedales madrileños.

Valor divulgativo

Estos observatorios permiten comprender:

- Ciclos biológicos.
- Calidad del agua.
- Importancia de pequeños humedales.
- Sensibilidad frente al cambio climático.

Especies destacadas



Pleurodeles waltl

Gallipato

Iberian Ribbed Newt

Epidalea calamita

Sapo corredor

Natterjack Toad



Hyla molleri

Ranita de San Antonio

European Tree Frog

Mauremys leprosa

Galápago leproso

Mediterranean Pond Turtle



Foto 12 – Sapo corredor (*Epidalea calamita*)

7.5 Observatorios urbanos y periurbanos

La red también pone en valor la biodiversidad presente en entornos urbanos y periurbanos. Estas especies conviven con nosotros y enriquecen nuestro entorno cotidiano, recordándonos que la naturaleza está mucho más cerca de lo que imaginamos.

Objetivos

- Acercar la naturaleza a la ciudadanía.
- Fomentar la observación en entornos cercanos.
- Reforzar el vínculo entre las personas y el importante patrimonio natural de la región.



Foto 13 - Abubilla común (*Upupa epops*)

7.6 Observatorios de especies singulares

La red incorpora enclaves especializados para especies emblemáticas:

Especies destacadas

Ciconia nigra
Cigüeña negra
Black Stork



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Falco naumanni
Cernícalo primilla
Lesser Kestrel



La observación responsable de la naturaleza se convierte en una poderosa herramienta para la conservación y la sensibilización.

08 | Uso responsable y conservación

La experiencia de observación no consiste únicamente en “ver especies”, sino en comprender paisajes, sonidos, ciclos naturales y procesos ecológicos.

La fauna es dinámica y cambiante, por lo que un mismo observatorio puede ofrecer resultados muy distintos en función del momento del día y de la estación del año en que se visite.

Principios fundamentales

- Respeto a la fauna.
- Minimización de molestias.
- Uso de itinerarios señalizados.
- Observación responsable.



Foto 14 – Ecosistemas asociados a zonas húmedas

09 | Coordinación con ayuntamientos

La implantación de la red se realiza en estrecha colaboración con los municipios implicados.

La red se concibe como un proyecto común entre la Comunidad de Madrid y los municipios para poner en valor la biodiversidad local y generar oportunidades para el territorio.

Papel de los ayuntamientos

- Puesta en valor del patrimonio natural.
- Integración de la red en la oferta local.
- Acogida y orientación de visitantes.
- Impulso al desarrollo local sostenible.



Foto 15 – Embalse de Santillana

10 Impacto territorial y desarrollo rural

La observación de fauna puede convertirse en un motor económico sostenible para numerosos municipios rurales.

La conservación de la naturaleza y el desarrollo rural han de ir de la mano. La observación de fauna genera oportunidades para atraer visitantes, impulsar la economía de los municipios y reforzar su identidad como territorios vinculados a un patrimonio natural único.

Impactos esperados

- Incremento de visitantes interesados en la naturaleza.
- Fortalecimiento de la economía rural.
- Apoyo al comercio local.
- Dinamización hostelera.
- Nuevas actividades vinculadas al ecoturismo.



Foto 16 – Vista panorámica de Canencia

11 Beneficios del proyecto



Beneficios ambientales



Conservación de hábitats.



Reducción de impactos.



Sensibilización.

Beneficios sociales



Educación ambiental.



Acceso ordenado a la naturaleza.



Conexión ciudadanía-territorio.



Beneficios económicos



Turismo sostenible.



Economía local.



Fijación de población.

12 Conclusiones


La Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid representa una apuesta estratégica por integrar biodiversidad, ciudadanía y territorio en un modelo de conservación activa y desarrollo sostenible.

Su implantación progresiva, en colaboración con los ayuntamientos, permitirá configurar una red representativa de todos los ecosistemas de la región, ampliando la oferta de naturaleza ligada al medio rural, compatible con la protección del rico patrimonio natural de la Comunidad de Madrid.

13 Mensajes clave finales

**La biodiversidad
es un patrimonio
estratégico**



**La observación de
fauna puede impulsar
el desarrollo rural**



**Madrid cuenta con
una extraordinaria
riqueza natural**

**Los municipios son
aliados fundamentales
del proyecto**


**La educación
ambiental es clave
para conservar el
territorio**



**La red ordena y
mejora la experiencia
de observación**

**Conservación y
turismo sostenible
son compatibles**

14 Enclaves actuales de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid



15 Situación actual de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid

Nº	Nombre	Tipología	Municipio	Fauna observable	Estado actual y mejoras previstas
1	Jardín botánico de la Universidad de Alcalá	 Observatorio	Alcalá de Henares	Aves de entornos urbanos	Observatorio existente
2	Las Huelgas	 Observatorio	Algete	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
3	Canteras de Alpedrete	 Punto de observación	Alpedrete	Aves de zonas húmedas/ anfibios	Punto de observación pendiente de señalización
4	Laguna de Soto de las Cuevas – Garza imperial	 Observatorio	Aranjuez	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente
5	Laguna de Soto de las Cuevas – Zampullín común	 Observatorio	Aranjuez	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
6	Mar de Ontígola	 Observatorio	Aranjuez	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
7	Barranco del Pastor	 Punto de observación	Batres	Especies concretas: abejarucos y paseriformes	Punto de observación pendiente de señalización
8	Colada del Camino de Fresno	 Observatorio	Camarma de Esteruelas	Aves de zonas agrícolas y pseudoestepas	Nuevo observatorio propuesto
9	Carretera de la República: Majavilán a Navarrulaque	 Itinerario	Cercedilla	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización
10	Centro de Visitantes Valle de la Fuenfría – Collado de Marichiva	 Itinerario	Cercedilla	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización

15 Situación actual de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid

Nº	Nombre	Tipología	Municipio	Fauna observable	Estado actual y mejoras previstas
11	Centro de Educación Ambiental "El Águila"	 Punto de observación	Chapinería	Fauna de ecosistemas forestales	Punto de observación pendiente de señalización
12	Laguna de San Juan - Avetorillo común	 Observatorio	Chinchón	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
13	Laguna de San Juan - Carricero tordal	 Observatorio	Chinchón	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente
14	Soto Gutiérrez	 Punto de observación	Ciempozuelos	Aves de zonas húmedas	Punto de observación pendiente de señalización
15	Arroyo del Valle	 Itinerario	Cobeña	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización
16	Cordel de la Marmota	 Itinerario	Colmenar Viejo	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización
17	La Chanta - Interior	 Observatorio	Corpa	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente
18	La Chanta - Mirador	 Observatorio	Corpa	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente
19	Colada del Camino del Monte y Cordel Galiana	 Itinerario	Daganzo de Arriba	Aves de zonas agrícolas y pseudoestepas - Aves de zonas húmedas	Itinerario existente pendiente de señalización
20	Embalse de Pedrezuela	 Observatorio	Guadalix de la Sierra	Aves de zonas húmedas	Nuevo observatorio propuesto

15 Situación actual de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid

Nº	Nombre	Tipología	Municipio	Fauna observable	Estado actual y mejoras previstas
21	Parque de Polvoranca	 Observatorio	Leganés	Aves de entornos urbanos	Observatorio existente
22	Mirador de la Visera	 Punto de observación	Los Santos de la Humosa	Aves de zonas agrícolas y pseudoestepas - ecosistemas forestales	Punto de observación pendiente de señalización
23	Dehesa Ribera Río Henares	 Itinerario	Los Santos de la Humosa	Aves de zonas húmedas	Itinerario existente pendiente de señalización
24	Parque del Oeste	 Observatorio	Madrid	Aves de entornos urbanos	Observatorio existente
25	Cerro Garabitas	 Punto de observación	Madrid	Aves de entornos urbanos	Punto de observación pendiente de señalización
26	Pinar del Santo	 Itinerario	Madrid	Aves de entornos urbanos	Itinerario existente pendiente de señalización
27	El Pardo - Portillera del Tambor	 Itinerario	Madrid	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización
28	Dehesa de Majadahonda	 Itinerario	Majadahonda	Aves de entornos urbanos	Itinerario existente pendiente de señalización
29	Embalse de Santillana	 Observatorio	Manzanares el Real	Aves de zonas húmedas	Observatorios existentes
30	Embalse de Santillana - Río Samburiel	 Punto de observación	Manzanares el Real	Aves de zonas húmedas	Punto de observación pendiente de señalización

15 Situación actual de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid

Nº	Nombre	Tipología	Municipio	Fauna observable	Estado actual y mejoras previstas
31	Descansadero Cañada Real Meco – Camarma	 Itinerario	Meco	Aves de zonas agrícolas y pseudoestepas	Itinerario existente pendiente de señalización
32	Lagunas de la Presa del río Henanes	 Observatorio	Mejorada del Campo	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
33	La Morcuera	 Punto de observación	Miraflores de la Sierra	Fauna de ecosistemas forestales	Punto de observación pendiente de señalización
34	Puerto de Navacerrada – Emburriaderos	 Itinerario	Navacerrada–Cercedilla	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización
35	Parque Forestal Adolfo Suárez	 Observatorio	Pozuelo de Alarcón	Aves de entornos urbanos	Observatorio existente
36	Mirador de los Robledos	 Itinerario	Rascafría	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización
37	Puerto de la Morcuera – Loma de Bailanderos	 Itinerario	Rascafría	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización
38	Puerto de Los Cotos – Pico Peñalara	 Itinerario	Rascafría	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización
39	Laguna del Campillo	 Observatorio	Rivas – Vaciamadrid	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
40	Laguna de Soto de las Juntas– Cerceta común	 Observatorio	Rivas – Vaciamadrid	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar

15 Situación actual de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid

Nº	Nombre	Tipología	Municipio	Fauna observable	Estado actual y mejoras previstas
41	Laguna de Soto de las Juntas-Pato colorado	 Observatorio	Rivas - Vaciamadrid	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
42	Laguna de Soto de las Juntas-Somormujo lavanco	 Observatorio	Rivas - Vaciamadrid	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
43	Laguna de Soto de las Juntas-Zampullín cuellinegro	 Observatorio	Rivas - Vaciamadrid	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar: nuevo observatorio propuesto
44	Caserío de Henares-Charca anfibios	 Observatorio	San Fernando de Henares	Anfibios	Observatorio existente
45	Lagunas de Cerro Gordo-Laguna Chica	 Observatorio	San Fernando de Henares	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
46	Lagunas de Cerro Gordo-Laguna Grande	 Observatorio	San Fernando de Henares	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
47	Lagunas de Cerro Gordo-Tarays	 Observatorio	San Fernando de Henares	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
48	Mirador del Monte Abantos	 Punto de observación	San Lorenzo de El Escorial	Fauna de ecosistemas forestales	Punto de observación pendiente de señalización
49	Los Albardales	 Observatorio	San Martín de la Vega	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
50	Mirador Valle de la Alcarria	 Observatorio	Santorcaz	Aves de zonas agrícolas y pseudoestepas	Observatorio existente

15 Situación actual de la Red de Observatorios de Fauna de la Comunidad de Madrid

Nº	Nombre	Tipología	Municipio	Fauna observable	Estado actual y mejoras previstas
51	Soto Bayona	 Observatorio	Titulcia	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente
52	Castillo de Torrejón de Velasco	 Punto de observación	Torrejón de Velasco	Especies concretas: cernícalo primilla	Punto de observación pendiente de señalización
53	Área recreativa Valgallego	 Punto de observación	Torrelaguna	Fauna de ecosistemas forestales – Especies concretas: buitre leonado	Punto de observación pendiente de señalización
54	Mirador de Valdelagamar	 Punto de observación	Tres Cantos	Fauna de ecosistemas forestales	Punto de observación pendiente de señalización
55	Vereda de las Tapias de Viñuelas	 Itinerario	Tres Cantos	Fauna de ecosistemas forestales	Itinerario existente pendiente de señalización
56	Charca de la Cañada Real Segoviana	 Punto de observación	Valdemorillo	Anfibios	Punto de observación pendiente de señalización
57	Cañada de la Virgen del Campo	 Itinerario	Valdetorres del Jarama	Aves de zonas húmedas – Aves de zonas agrícolas y pseudoestepas	Itinerario existente pendiente de señalización
58	Mirador Camino de los Ángeles	 Observatorio	Valverde de Alcalá	Aves de zonas agrícolas y pseudoestepas	Observatorio existente
59	Lagunas de Velilla- Miralrío	 Observatorio	Velilla de San Antonio	Aves de zonas húmedas	Observatorio existente a mejorar
60	Senda Fluvial y Cordel de la Asperilla	 Itinerario	Villamanrique de Tajo	Aves de zonas húmedas – Aves de zonas agrícolas y pseudoestepas	Itinerario existente pendiente de señalización



Ubicación: Alcalá de Henares

Moderno observatorio de madera ubicado en ámbito urbano en el interior del Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá. La diversidad forestal y los espacios del Jardín Botánico actúan como una isla refugio de diversidad ornitológica dentro del campus universitario. Se accede tras un cómodo paseo desde la entrada principal del jardín botánico. Permite realizar observaciones de especies de aves comunes y forestales a corta distancia.



Coordenadas UTM (ETRS89) X:470857 Y:4483959

Aves destacadas



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch

Paseriforme de pico robusto adaptado a una dieta granívora. Su cuerpo mantiene tonos verdes homogéneos y sus alas se ven decoradas de grises y amarillos.



Coccothraustes coccothraustes
Picogordo común
Hawfinch

Paseriforme destacable por su pico muy robusto y las marcas oscuras que lo rodean. Se encuentra habitualmente posado en lo alto de las ramas.



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker

Pájaro carpintero común en bosques y arboledas. De colores blancos y negros y patrón ajedrezado en sus alas. El macho adulto tiene una mancha roja distintiva en la nuca.



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker

Pájaro carpintero de color verde, al volar permite ver el amarillo de su obispillo. Emite sonidos en forma de relinchos y risas que delatan su presencia. Se alimenta en gran parte de hormigas.



Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw

Córido reconocible por los tonos grisáceos de su cabeza, donde destaca su ojo claro. Es un ave sociable y se le suele ver formando grandes bandos.

Y también...



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Aegithalos caudatus
Mito común
Long-tailed Tit



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Passer domesticus
Gorrión común
House Sparrow



Passer montanus
Gorrión molinero
Eurasian Tree Sparrow



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit




Pica pica
Urraca común
Eurasian Magpie

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Algete

El entorno está formado por un conjunto de humedales no permanentes, de origen artificial, alimentados por aguas del río Jarama en cuyo meandro, al este de la urbanización Santo Domingo, se ubican. El observatorio se encuentra asociado a la lámina de agua más grande y más al norte, donde pueden observarse aves acuáticas. El soto que rodea el humedal crea cobijo también para aves forestales ampliando el elenco de aves que ofrece este entorno.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 452322 Y: 4497450

Aves destacadas



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Ave estival que se oculta en la vegetación tratando de pasar desapercibida. Su canto aflautado delata su presencia en las arboledas. Cuando vuela el macho llama la atención por su vivo color amarillo.



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian Golden Oriole



Milvus milvus
Milano real
Red Kite

Fácilmente reconocible por su cola ahorquillada y sus colores rojizos en el pecho y blanco contrastado en las alas. Está presente todo el año pero sus números aumentan en invierno.



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

Fácilmente avistable durante primavera y verano. Especie migratoria que cría en la Península Ibérica durante el periodo estival. En general es de color más oscuro que el milano real y con las plumas de la cola menos ahorquilladas.



Alcedo atthis
Martín pescador común
Common Kingfisher

Llamativo por su color azul turquesa, pico largo que usa para pescar y su metálico y estridente reclamo. Se posa en carrizos o ramas bajas desde donde se lanza en picado a pescar. Habitual de los ríos y humedales madrileños.

Y también...



Mareca strepera
Anade friso
Gadwall



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Dryobates minor
Pico menor
Lesser Spotted Woodpecker



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird




Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Alpedrete

Este punto de observación se ubica frente a uno de los huecos creados como consecuencia del pasado cantero de Alpedrete, ahora convertido en humedal de alto valor ecológico. Este enclave constituye un claro ejemplo de la conexión entre el legado histórico y riqueza natural actual del entorno. La combinación de ambientes forestales, ganaderos y acuáticos configura un mosaico de hábitats que favorece la presencia de una notable diversidad de especies de fauna.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 414155 Y:4502325

Especies destacadas



Hyla molleri
Ranita de San Antonio
European Tree Frog

Pequeño anfibio, que vive cerca de humedales, famoso por su color verde brillante, sus dedos con ventosas para trepar y su canto distintivo en primavera para atraer pareja.

Sapo de mediano tamaño con predominantes tonos verdes. Reconocible por su ojo verdoso de pupila horizontal. Su nombre se debe a su preferencia por dar pequeñas carreras en lugar de emplear saltos para trasladarse.



Epidalea calamita
Sapo corredor
Natterjack Toad



Bufo spinosus
Sapo común ibérico
Spiny Toad

Sapo de gran tamaño, con cuerpo robusto y cabeza ancha. De coloración predominantemente parda, en el que contrastan sus ojos rojizos anaranjados. Es el mayor anfibio de España.



Pleurodeles waltl
Gallipato
Iberian Ribbed Newt

Anfibio de hábitos mayoritariamente acuáticos. Se caracteriza por las protuberancias anaranjadas de sus flancos, ligadas a sus costillas, que puede proyectar como mecanismo de defensa frente a depredadores.

Y también...



Pelodytes punctatus
Sapillo moteado
Common Parsley Frog



Pelophylax perezi
Rana verde común
Iberian Water Frog



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Sylvia atricapilla
Curruca capirotada
Eurasian Blackcap



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Aranjuez

Observatorio situado en la parte norte de la laguna de Soto de las Cuevas, originada por la actividad minera asociada a la extracción de arenas y gravas, actualmente restaurada. Este enclave, resguardado por el río Jarama, constituye un espacio de gran interés para la biodiversidad, al ofrecer condiciones óptimas para el refugio de numerosas especies. Las visitas a este entorno se realizan en el marco de actividades organizadas, consultar la información disponible en la "Senda Soto de las Cuevas" en la página web de la Comunidad de Madrid.



Coordenadas UTM (ETRS89) X:447988 Y:4438736

Aves destacadas



Marmaronetta angustirostris
Cerceta pardilla
Marbled Duck

Pato nadador de pequeño tamaño, pico fino y dimorfismo sexual poco evidente. Plumaje pardo claro moteado y un característico antifaz oscuro. Su alimentación es omnívora.



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe

Ave acuática de pequeño tamaño. Reproductor e invernante muy común. Aparece y desaparece en la superficie del agua con sus zambullidas.



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler

Anátida abundante en invierno con preferencia por las aguas calmas de lagunas y antiguas graveras. Inconfundible por su característico pico en forma de espátula.



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojizo y negro de su cuerpo.

Y también...



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron



Himantopus himantopus
Cigüeñuela común
Black-winged Stilt



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swampphen



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover



Hirundo rustica
Golondrina común
Barn Swallow




Riparia riparia
Avión zapador
Sand Martin

● Residente ● Estival ● Invernante



Ubicación: Aranjuez

Observatorio situado en la parte sur de la laguna de Soto de las Cuevas, originada por la actividad minera asociada a la extracción de arenas y gravas, actualmente restaurada. Este enclave, resguardado por el río Jarama, constituye un espacio de gran interés para la biodiversidad, al ofrecer condiciones óptimas para el refugio de numerosas especies. Las visitas a este entorno se realizan en el marco de actividades organizadas, consultar la información disponible en la "Senda Soto de las Cuevas" en la página web de la Comunidad de Madrid.



Coordenadas UTM (ETRS89) X:447653 Y:4438359

Aves destacadas



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler

Anátida abundante en invierno con preferencia por las aguas calmas de lagunas y gravas. Inconfundible por su característico pico en forma de espátula.

Ave acuática de pequeño tamaño. Reproductor e invernante muy común. Aparece y desaparece en la superficie del agua con sus zambullidas.



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojo y negro de su cuerpo.

Y también...



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Riparia riparia
Avión zapador
Sand Martin



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Himantopus himantopus
Cigüeñuela común
Black-winged Stilt

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Aranjuez

Humedal de origen artificial, formado a partir de un embalse construido históricamente para el riego de los jardines de Aranjuez, hoy transformado en un enclave de gran valor para la conservación de la biodiversidad. Dispone de aparcamiento junto a la carretera, desde el que se accede a pie hasta el observatorio elevado. La visita resulta especialmente recomendable durante la invernada y los periodos de paso migratorio, cuando aumenta notablemente la diversidad de aves presentes.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 448984 Y:4429775

Aves destacadas




Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.

Marcado dimorfismo sexual. El plumaje nupcial del macho contrasta con su rostro y cresta rojizos contra el cuello negro. Mantiene el pico colorado durante todo el año.



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojizo y negro de su cuerpo.

Y también...



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Aythya fuligula
Porrón moñudo
Tufted Duck



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Egretta garzetta
Garceta común
Little Egret



Himantopus himantopus
Cigüeñuela común
Black-winged Stilt



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail





Alcedo atthis
Martín pescador
Common Kingfisher

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Batres

Punto de observación próximo a la urbanización de Cotorredondo, en las inmediaciones del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. En este enclave destaca un talud arenoso que alberga una relevante colonia de abejaruco europeo, fácilmente observable durante la época reproductora. Este entorno vinculado al propio parque regional, favorece la presencia de numerosas especies de interés, convirtiendo este espacio en un punto privilegiado para la observación de aves.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 419653 Y: 4455256

Aves destacadas



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater

Ave muy llamativa por sus exóticos colores dorados y turquesas, especializada en cazar insectos en vuelo. Anida en taludes y agujeros en el suelo durante el periodo estival.

Pájaro carpintero de color verde, al volar permite ver el amarillo de su obispillo. Emite sonidos en forma de relinchos y risas que delatan su presencia. Se alimenta en gran parte de hormigas.



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch

Paseriforme de pico robusto adaptado a una dieta granívora. Su cuerpo mantiene tonos verdes homogéneos y sus alas se ven decoradas de grises y amarillos.

Inconfundible por su cresta, que puede elevar a voluntad. Es un ave típica de encinares y dehesas. Emplea su fino pico para capturar invertebrados.



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Sylvia atricapilla
Curruca capirotada
Eurasian Blackcap

Reconocible por su píleo oscuro: negro en el macho y marrón en la hembra, que destacan sobre su tonalidad. Habitual en setos, zarzales y bosquetes y en parques urbanos.

Y también...



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Alauda arvensis
Alondra común
Eurasian Skylark



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Milvus milvus
Milano real
Red Kite



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante


Ubicación: Camarma de Esteruelas

La subida desde el pueblo por la Colada del Camino del Fresno conduce hasta el descansadero de esta vía pecuaria, un punto privilegiado para la observación de fauna asociada a entornos agrícolas. Desde aquí se domina una amplia zona de cultivos de cereal y barbechos que, al alternarse, crean un mosaico agrícola ideal para las aves esteparias. Con paciencia, en las horas adecuadas y provisto de prismáticos, es posible detectar especies tan emblemáticas como el sisón o la avutarda, ya sea en vuelo o moviéndose entre los barbechos.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 467211 Y: 4490291

Aves destacadas



Otis tarda
Avutarda euroasiática
Great Bustard

Ave inconfundible, de gran tamaño. Habitante característico de las extensas llanuras cerealistas. Las hembras son de menor tamaño y lucen un plumaje algo más apagado.

Especie gregaria. En primavera, durante el celo, los machos destacan por sus exhibiciones y cantos, contrastando los collares blancos contra el negro de su cuello.



Tetrax tetrax
Sisón común
Little bustard



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.

Ave rapaz de tamaño medio. Presenta dimorfismo sexual, siendo los machos bastante claros y las hembras de mayor tamaño y de tonos parduzcos. Habita en grandes herbazales.



Circus pygargus
Aguilucho cenizo
Montagu's Harrier



Milvus milvus
Milano real
Milano real

Fácilmente reconocible por su cola ahorquillada y sus colores rojizos en el pecho y blanco contrastado en las alas. Está presente todo el año pero sus números aumentan en invierno.

Y también...



Burhinus oedicnemus
Alcaraván común
Eurasian Stone-curlew



Coturnix coturnix
Codorniz común
Common Quail



Streptopelia turtur
Tórtola europea
European Turtle Dove



Alauda arvensis
Alondra común
Eurasian Skylark



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Pica pica
Urraca común
Eurasian Magpie



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch




Athene noctua
Mochuelo europeo
Little Owl

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Cercedilla

Ruta de ida y vuelta, con una distancia total de 10,1 km, que asciende suavemente por la antigua Carretera de la República, siguiendo una pista en algunos tramos asfaltada que sale de la barrera de Majavilán (cerca de la fuente del mismo nombre), hasta alcanzar la pradera de Navarrulaque. Antes de llegar a este punto, el recorrido discurre por los miradores de Vicente Aleixandre y Luis Rosales, desde los que se obtienen amplias panorámicas de la sierra, con cumbres destacadas como La Maliciosa, Siete Picos o Guarramillas, así como vistas hacia el embalse de Navacerrada e incluso el de Valmayor.




Coordenadas UTM (ETRS89) X: 409702 Y: 4513918

Especies destacadas



Capreolus capreolus
Corzo
European
Roe Deer

Pequeño cérvido de pelaje pardo-rojizo, y grisáceo en invierno, con característicos cuernos cortos en los machos. Habita bosques abiertos y zonas agrícolas. De hábitos crepusculares y solitarios.



Sus scrofa
Jabalí
Wild boar

Especie salvaje de la que desciende el cerdo doméstico. Es un animal gregario, las hembras forman grupos sociales estables. Es una especie de actividad nocturna y crepuscular.



Sitta europaea
Trepador azul
Eurasian Nuthatch

Pequeña ave forestal de dorso gris azulado, vientre ocre y lista negra ocular, que habita bosques maduros. Es insectívoro en primavera y verano; pero en otoño e invierno consume semillas y frutos secos que almacena en grietas.



Periparus ater
Carbonero garrapinos
Coal Tit

Pequeña ave forestal de cabeza negra y mancha blanca en la nuca. Habitual en bosques de coníferas y zonas montañosas, destaca por su pico fino y cuerpo compacto. Es insectívoro en verano y granívoro en invierno.



Ficedula hypoleuca
Papamoscas cerrojillo
European Pied Flycatcher

Pequeña ave migratoria que habita bosques caducifolios y mixtos. Posee plumaje contrastado (macho negro y blanco; hembra pardagrisácea). Se alimenta de insectos que caza al vuelo o en el suelo y complementa su dieta con bayas en otoño.

Y también...



Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chova piquirroja
Red-billed Chough



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Accipiter gentilis
Azor común
Northern Goshawk



Lucanus cervus
Ciervo volante
European Stag Beetle



Fringilla coelebs
Pinzón vulgar
Common Chaffinch



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle





Milvus milvus
Milano real
Red Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Cercedilla

Ruta circular de 9,5 km que comienza en el Centro de Visitantes Valle de la Fuenfría y se encuentra señalizada con círculos rojos. El recorrido discurre íntegramente entre pinares de pino silvestre, la especie más representativa de este valle, combinando tramos históricos como el Camino Viejo de Segovia y la vereda del Poyal de la Garganta. Tras una exigente ascensión se alcanza el collado de Marichiva. El regreso se realiza por la pista forestal conocida como Calle Alta durante aproximadamente 3 km, hasta un desvío a la izquierda por la Vereda de la Piñuela que conduce al Hospital de la Fuenfría y de vuelta al punto de inicio.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 409597 Y: 4512416

Especies destacadas



Capreolus capreolus
Corzo
European
Roe Deer

Pequeño cérvido de pelaje pardo-rojizo, y grisáceo en invierno, con característicos cuernos cortos en los machos. Habita bosques abiertos y zonas agrícolas. De hábitos crepusculares y solitarios.

Pequeña ave forestal de dorso gris azulado, vientre ocre y lista negra ocular, que habita bosques maduros. Es insectívoro en primavera y verano; pero en otoño e invierno consume semillas y frutos secos que almacena en grietas.



Sitta europaea
Trepador azul
Eurasian Nuthatch



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle

En vuelo contrasta el blanco del vientre e interior de las alas con el borde negro del exterior de estas. Se identifica por una mancha blanca entre el cuello y el hombro.

Mariposa nocturna endémica de España y el sur de los Alpes franceses, que vive en bosques de coníferas. Destaca por sus grandes alas verde esmeralda con venas rojizas y ocelos de varios colores y largas colas.



Graellsia isabellae
Mariposa isabelina
Spanish Moon Moth



Lophophanes cristatus
Herrerillo capuchino
European Crested Tit

Pequeña ave que destaca por su prominente cresta apuntada y collar negro en su plumaje grisáceo. Habita bosques de coníferas, especialmente pinares, donde busca incansablemente larvas y arañas entre la corteza, aunque también consume semillas de piñas en invierno.

Y también...



Periparus ater
Carbonero garrapinos
Coal Tit



Ficedula hypoleuca
Papamoscas cerrojillo
European Pied Flycatcher



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Accipiter gentilis
Azor común
Northern Goshawk



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Lucanus cervus
Ciervo volante
European Stag Beetle



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture





Milvus milvus
Milano real
Red Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Chapinería

Ubicado en el Centro de Educación Ambiental “El Águila”, este punto de observación orienta sus vistas hacia las dehesas y montes que se extienden al sueste del núcleo urbano. Su emplazamiento privilegiado ofrece una amplia panorámica del paisaje, facilitando el avistamiento de majestuosas y emblemáticas aves rapaces que sobrevuelan y campean en este entorno forestal.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 397759 Y: 4470317

Aves destacadas



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

Águila robusta. Es generalmente más oscura que el águila real lo que contrasta con sus hombros decorados de blanco. Los ejemplares jóvenes son de un color pardo más claro.



Circaetus gallicus
Culebrera europea
Short-toed Snake Eagle

Rapaz de considerable tamaño y voluminosa cabeza, armada de un corto pero robusto pico y dotada de grandes ojos amarillos orientados hacia el frente



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle

En vuelo contrasta el blanco del vientre e interior de las alas con el borde negro del exterior de estas. Se identifica por una mancha blanca entre el cuello y el hombro.



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie

Especie de córvido endémica de la Península Ibérica. Más pequeño que la urraca y muy ruidoso. Identificable por su capirote negro, el azul de sus alas y cola larga que destaca cuando vuela.



Milvus milvus
Milano real
Red Kite

Fácilmente reconocible por su cola ahorquillada y sus colores rojizos en el pecho y blanco contrastado en las alas. Está presente todo el año pero sus números aumentan en invierno.

Y también...



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit



Accipiter gentilis
Azor común
Northern Goshawk




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Chinchón

Este observatorio elevado, situado al este de la laguna, ofrece excelentes oportunidades para la observación y la fotografía de la fauna. Se trata de una laguna natural endorreica, recuperada y restaurada, rodeada de carrizal y convertida en refugio para una gran diversidad de aves acuáticas. Su orilla sur, flanqueada por lomas y formaciones arboladas, amplía las posibilidades de observación al albergar especies distintas a las propias del medio acuático. El acceso se realiza a través de la Vereda de la Blanca.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 455987 Y: 4443632

Aves destacadas



Remiz pendulinus
Pájaro moscón europeo
Eurasian Penduline Tit

Pequeño passeriforme con preferencia por la vegetación de ribera, en la cual se ubica su nido colgante. Detectable por su aguda llamada y su llamativo antifaz negro.

Habita en carrizales y vegetación densa. Es un migrador transahariano aumentando su presencia en primavera, siendo esta muy baja en invierno. Muy discreto, suele detectarse por su canto profundo y repetitivo.



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.

Y también...



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron



Emberiza schoeniclus
Escribano palustre
Common Reed Bunting



Panurus biarmicus
Bigotudo
Bearded Reedling



Phalacrocorax carbo
Cormorán grande
Great Cormorant



Mareca strepera
Ánade friso
Gadwall



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail





Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Chinchón

Este observatorio de madera recientemente restaurado, situado al sur de la laguna, ofrece excelentes oportunidades para la observación. Se trata de una laguna natural endorreica, recuperada y restaurada, rodeada de carrizal y convertida en refugio para una gran diversidad de aves acuáticas. Su orilla sur, flanqueada por lomas y formaciones arboladas, amplía las posibilidades de observación al albergar especies distintas a las propias del medio acuático. El acceso se realiza a través de la vía pecuaria Vereda de la Blanca.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 455403 Y: 4443394

Aves destacadas



Remiz pendulinus
Pájaro moscón europeo
Eurasian Penduline Tit

Pequeño passeriforme con preferencia por la vegetación de ribera, en la cual se ubica su nido colgante. Detectable por su aguda llamada y su llamativo antifaz negro.

Aparece en el periodo estival para ocupar los carrizales. Es un ave muy ruidosa, observable mientras canta posada sobre el carrizo. Es de mayor tamaño que el carricero común.



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.

Y también...



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron



Emberiza schoeniclus
Escribano palustre
Common Reed Bunting



Panurus biarmicus
Bigotudo
Bearded Reedling



Locustella luscinioides
Buscarla unicolor
Savi's Warbler



Mareca strepera
Ánade friso
Gadwall



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail




Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Ciempozuelos

La laguna de Soto Gutiérrez, ubicada en el Parque Regional del Sureste, constituye un humedal de gran valor ecológico que llegó a albergar más de 200 especies de aves, lo que le ha valido el sobrenombre de la "pequeña Doñana madrileña". En los últimos años este enclave ha experimentado una notable reducción de su lámina de agua. Desde 2024, la Fundación Global Nature impulsa su proceso de restauración orientado a la recuperación del humedal, integrando la conservación de la biodiversidad con un uso público sostenible y la educación ambiental.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 451508 Y: 4447065

Aves destacadas




Plegadis falcinellus
Morito común
Glossy Ibis

Especie de ibis que se encuentra en expansión a lo largo de la Península. Inconfundible gracias a su pico curvo y tonalidad oscura con plumas iridiscentes.

Aparece en el periodo estival para ocupar los carrizales. Es un ave muy ruidosa, observable mientras canta posada sobre el carrizo. Es de mayor tamaño que el carricero común.



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork

Ave inconfundible por su plumaje blanco contrastado por el negro de sus alas y el rojo de su pico y patas. Especie común todo el año, con individuos que vienen a invernar a la región.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Emberiza schoeniclus
Escribano palustre
Common Reed Bunting

Ave muy llamativa por sus exóticos colores dorados y turquesas, especializada en cazar en vuelo. Como otras aves palustres, hace el nido entre el carrizo.

Y también...



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Egretta garzetta
Garceta común
Little Egret



Himantopus himantopus
Cigüeñuela común
Black-winged Stilt



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Milvus milvus
Milano real
Red Kite



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante ● De paso

Ubicación: Cobeña

Itinerario de 1,7 km que discurre paralelo al arroyo del Valle. Las laderas que lo enmarcan, cubiertas por formaciones arboladas, constituyen un hábitat idóneo para diversas y destacadas rapaces forestales, lo que convierte esta senda en un enclave especialmente favorable para su observación en vuelo y en posadero. Además, las parcelas agrícolas situadas en los márgenes superiores del valle favorecen la presencia de aves propias de medios abiertos y esteparios.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 455512 Y: 4490669

Aves destacadas



Milvus milvus
Milano real
Milano real

Fácilmente reconocible por su cola ahorquillada y sus colores rojizos en el pecho y blanco contrastado en las alas. Está presente todo el año pero sus números aumentan en invierno.

Fácilmente avistable durante primavera y verano. Especie migratoria que cría en la Península Ibérica durante el periodo estival. En general es de color más oscuro que el milano real y con las plumas de la cola menos ahorquilladas.



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite



Buteo buteo
Busardo ratonero
Common Buzzard

Rapaz de tamaño medio, plumaje muy variable (marrón a blanquecino) y alas anchas. Es un cazador oportunista que se alimenta de pequeños mamíferos, aves, reptiles y carroña.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Águilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

Águila robusta. Es generalmente más oscura que el águila real lo que contrasta con sus hombros decorados de blanco. Los ejemplares jóvenes son de un color pardo más claro.

Y también...



Aegithalos caudatus
Mito común
Long-tailed Tit



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Circaetus gallicus
Culebrera europea
Short-toed Snake Eagle



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Colmenar Viejo – Tres Cantos

El acceso a este punto de observación se realiza desde el polígono industrial de Colmenar Viejo, avanzando hacia Tres Cantos por el Cordel de la Marmota hasta el Alto de la Marmota. Desde esta posición elevada se obtiene una panorámica excepcional del monte de El Pardo, dominado por un encinar maduro que bordea el embalse homónimo alimentado por el río Manzanares. La zona constituye un enclave de alto valor faunístico. Es habitual observar el vuelo de aves forestales ligadas a masas arboladas, así como la presencia de ciervos y otros ungulados. Entre septiembre y octubre, la berrea convierte este punto en un observatorio privilegiado para la escucha y seguimiento del comportamiento reproductor del venado.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 431791 Y: 4495823

Especies destacadas



Cervus elaphus
Ciervo rojo
Red Deer

Ungulado salvaje de mayor tamaño de la Península Ibérica. Se caracteriza por las astas ramificadas de los machos. Al final del verano e inicio del otoño se puede oír la berrea de los machos.



Dama dama
Gamo europeo
European Fallow Deer

Cérvido de mediano tamaño fácilmente reconocible por su librea negra y blanca en su parte trasera. Los machos tienen las astas en forma de palas con puntas. En primavera su pelaje se cubre de motas blancas.



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

Águila robusta. Es generalmente más oscura que el águila real lo que contrasta con sus hombros decorados de blanco. Los ejemplares jóvenes son de un color pardo más claro.



Bubo bubo
Búho real
Eurasian Eagle-Owl

Rapaz nocturna más grande de Europa. Posee un plumaje críptico de tonos leonados, pardos y marrones y unos penachos cefálicos característicos. Es un superdepredador muy versátil.




Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.

Y también...



Asio otus
Búho chico
Long-eared Owl



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Athene noctua
Mochuelo europeo
Little Owl



Coracias garrulus
Carraca europea
European Roller



Streptopelia turtur
Tórtola europea
European Turtle Dove



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker

● Residente ● Estival ● Invernante ● De paso

Ubicación: Corpa

Antigua cantera de caliza restaurada en humedal de alto valor ecológico, titularidad de la empresa Holcim. El enclave cuenta con un mirador y un hide fotográfico gestionados por la entidad de custodia Brinzal. El hide ubicado en la orilla, se alcanza mediante un recorrido a pie descendente por la propia cantera. La instalación dispone asimismo de aparcamiento propio. Las visitas se realizan exclusivamente en el marco de actividades organizadas, por lo que se recomienda consultar la programación en la web lachanta.org.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 477183 Y: 4473113

Aves destacadas



Oenanthe leucura
Collalba negra
Black Wheatear

Pequeña ave terrestre, negra con el obispillo y los laterales de cola de color blanco. Suele verse su silueta posada sobre rocas y cortados.

Ave acuática de pequeño tamaño. Reproductor e invernante muy común. Aparece y desaparece en la superficie del agua con sus zambullidas.



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover

Pequeño y activo. Se le suele observar correteando con rapidez por las orillas. Su anillo ocular amarillo contrasta con su antifaz negro.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail

Pequeña gruiforme con pico alargado y rojizo, de canto estridente. Se suele ocultar entre la vegetación de las zonas húmedas.

Y también...



Lolana debilitata
Mariposa del espantalobos
Lolas Blue



Riparia riparia
Avión zapador
Sand Martin



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Milvus milvus
Milano real
Red Kite



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Common Reed Warbler



Pelodytes punctatus
Sapillo moteado
Common Parsley Frog




Epidalea calamita
Sapo corredor
Natterjack Toad

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Corpa

Antigua cantera de caliza restaurada en humedal de alto valor ecológico, titularidad de la empresa Holcim. El enclave cuenta con un mirador y un hide fotográfico gestionados por la entidad de custodia Brinzal. El observatorio del mirador se encuentra en altura sobre la antigua cantera permitiendo una vista panorámica del humedal. La propiedad tiene aparcamiento propio. Las visitas se llevan a cabo en el seno de actividades planificadas, consultar en lachanta.org.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 477249 Y: 4473184

Aves destacadas



Oenanthe leucura
Collalba negra
Black Wheatear

Pequeña ave terrestre, negra con el obispillo y los laterales de cola de color blanco. Suele verse su silueta posada sobre rocas y cortados.

Fácilmente avistable durante primavera y verano. Especie migratoria que cría en la Península Ibérica durante el periodo estival. En general es de color más oscuro que el milano real y con las plumas de la cola menos ahorquilladas.



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover

Pequeño y activo. Se le suele observar correteando con rapidez por las orillas. Su anillo ocular amarillo contrasta con su antifaz negro.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail

Pequeña gruiforme con pico alargado y rojizo, de canto estridente. Se suele ocultar entre la vegetación de las zonas húmedas.

Y también...



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Riparia riparia
Avión zapador
Sand Martin



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Milvus milvus
Milano real
Red Kite



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Common Reed Warbler



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe

● Residente ● Estival ● Invernante

Ilustraciones: Juan Varela


Ubicación: Daganzo de Arriba

Itinerario circular de 10 km desde Daganzo de Arriba con salida por la Colada del Camino del Monte y retorno por el Cordel Galiana. El recorrido atraviesa la zona norte del municipio, siguiendo el trazado de antiguas vías pecuarias y permitiendo adentrarse en un paisaje característico de la campiña. A lo largo del itinerario se suceden distintos ambientes, vegetación de ribera asociada al arroyo del Monte, campos de cultivo cerealista y áreas de monte bajo, que configuran un mosaico de hábitats de alto interés ecológico. Esta diversidad favorece la presencia de una rica comunidad de fauna, especialmente de avifauna esteparia, al situarse dentro del ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves "Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares".



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 462160 Y: 4490289

Aves destacadas



Otis tarda
Avutarda euroasiática
Great Bustard

Ave inconfundible, de gran tamaño. Habitante característico de las extensas llanuras cerealistas. Las hembras son de menor tamaño y lucen un plumaje algo más apagado.

Especie gregaria. En primavera, durante el celo, los machos destacan por sus exhibiciones y cantos, contrastando los collares blancos contra el negro de su cuello.



Tetrax tetrax
Sisón común
Little bustard



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.

Ave rapaz de tamaño medio. Presenta dimorfismo sexual, siendo los machos bastante claros y las hembras de mayor tamaño y de tonos parduzcos. Habita en grandes herbazales.



Circus pygargus
Aguilucho cenizo
Montagu's Harrier



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

Águila robusta. Es generalmente más oscura que el águila real lo que contrasta con sus hombros decorados de blanco. Los ejemplares jóvenes son de un color pardo más claro.

Y también...



Pterocles orientalis
Ganga ortega
Black-bellied Sandgrouse



Coturnix coturnix
Codorniz común
Common Quail



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Passer montanus
Gorrion molinero
Eurasian Tree Sparrow



Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw



Pica pica
Urraca común
Eurasian Magpie



Milvus milvus
Milano real
Red Kite



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Guadalix de la Sierra

Este entorno, seleccionado para la instalación de un nuevo observatorio, situado en la cola del embalse de Pedrezuela, constituye un enclave de gran interés para la observación de aves acuáticas, al ofrecer amplias zonas de aguas someras, profundas y vegetación palustre que atraen a numerosas especies. Desde él es posible avistar tanto aves nidificantes como invernantes. El acceso se realiza mediante un recorrido a pie de aproximadamente 800 metros desde el Complejo Deportivo Virgen del Espinar, en Guadalix de la Sierra.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 442997 Y: 4515210

Aves destacadas




Tadorna tadorna
Tarro blanco
Common Shelduck

Anátida de tamaño mediano. Es de colores llamativos por lo contrastado de su librea blanca y negra, atravesada por una franja pectoral de color castaño, y un pico con protuberancia roja muy característica en machos.

Garza de pequeño tamaño. Cuenta con un penacho estriado de largas plumas sobre su cabeza. Especie escasa que suele encontrarse cerca de la vegetación palustre.



Ardeola ralloides
Garcilla cangrejera
Squacco Heron



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De llamativos colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Anátida abundante en invierno con preferencia por las aguas calmas de lagunas y graveras. Inconfundible por su característico pico en forma de espátula.



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojo y negro de su cuerpo.

Y también...



Mareca strepera
Ánade friso
Gadwall



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Egretta garzetta
Garceta común
Little Egret



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Himantopus himantopus
Cigüeñuela común
Black-winged Stilt



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture




Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

● Residente ● Estival ● Invernante ● De paso

Ubicación: Leganés

Observatorio integrado en los jardines de un parque urbano, orientado hacia un canal que conecta con el estanque principal. Este entorno acoge una notable diversidad de aves, tanto urbanas como forestales y acuáticas, lo que lo convierte en un enclave especialmente atractivo para la observación ornitológica. Las visitas a este observatorio se realizan en el marco de actividades organizadas, por lo que se recomienda consultar la programación en el Centro de Educación Ambiental Polvoranca.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 432230 Y: 4464295

Aves destacadas



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler

Anátida abundante en invierno con preferencia por las aguas calmas de lagunas y graveras. Inconfundible por su característico pico en forma de espátula.



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker

Pájaro carpintero de color verde, al volar permite ver el amarillo de su obispillo. Emite sonidos en forma de relinchos y risas que delatan su presencia. Se alimenta en gran parte de hormigas.



Phalacrocorax carbo
Cormorán grande
Great Cormorant

Ave de coloración general negruzca, salvo la garganta, que es de tonos blanquecinos. Tiene el cuello largo y grueso y el pico prominente y gris.



Athene noctua
Mochuelo europeo
Little Owl

Pequeña rapaz nocturna de formas rechonchas, con cabeza carente de penachos y plumaje en tonos marrones y grisáceos. El vuelo es rápido y marcadamente ondulado.



Egretta garzetta
Garceta común
Little Egret

Garza blanca de mediano tamaño que suele estar posada en las orillas esperando cazar su alimento. Fácilmente reconocible por sus dedos de color amarillo.

Y también...



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw



Pica pica
Urraca común
Eurasian Magpie



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Passer domesticus
Gorrión común
House Sparrow



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Chroicocephalus ridibundus
Gaviota reidora
Black-headed Gull




Larus fuscus
Gaviota sombría
Lesser Black-backed Gull

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Los Santos de la Humosa

El Mirador de la Visera, al que se accede desde Santos de la Humosa a través de la Colada de Chiloeches, ofrece una de las panorámicas más amplias y espectaculares del entorno de Los Santos de la Humosa, dominado por cortados yesíferos, campos de cultivo y mosaicos de matorral mediterráneo. Este paisaje, tan característico de la Alcarria madrileña, acoge una fauna muy diversa, especialmente aves ligadas a medios abiertos, cortados y zonas agrícolas. Este punto de observación es un lugar perfecto para detenerse y contemplar la riqueza natural de un entorno tan variado y diverso donde cada estación ofrece nuevas oportunidades de observación.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 479737 Y: 4485183

Aves destacadas



Capreolus capreolus
Corzo
European
Roe Deer

Pequeño cérvido de pelaje pardo-rojizo, y grisáceo en invierno, con característicos cuernos cortos en los machos. Habita bosques abiertos y zonas agrícolas. De hábitos crepusculares y solitarios.

Ave muy llamativa por sus exóticos colores dorados y turquesas, especializada en cazar insectos en vuelo. Anida en taludes y agujeros en el suelo durante el periodo estival.



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Milvus milvus
Milano real
Red Kite

Fácilmente reconocible por su cola ahorquillada y sus colores rojizos en el pecho y blanco contrastado en las alas. Está presente todo el año pero sus números aumentan en invierno.

Rapaz nocturna más grande de Europa. Posee un plumaje críptico de tonos leonados, pardos y marrones y unos penachos cefálicos característicos. Es un superdepredador muy versátil.



Bubo bubo
Búho real
Eurasian Eagle-Owl



Aquila chrysaetos
Águila real
Golden Eagle

Imponente ave rapaz de gran envergadura y plumaje castaño oscuro con matices dorados en la nuca. Habita zonas montañosas y cantiles del hemisferio norte, donde caza con gran eficacia mamíferos y aves.

Y también...



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Streptopelia turtur
Tórtola europea
European Turtle Dove



Accipiter gentilis
Azor común
Northern Goshawk



Otus scops
Autillo europeo
Eurasian Scops Owl



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite



Alectoris rufa
Perdiz roja
Red-legged Partridge



Curruca melanocephala
Curruca cabecinegra
Sardinian Warbler




Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Los Santos de la Humosa

Itinerario de 1,5 km que discurre por la ribera del río Henares a través del monte de Utilidad Pública "Dehesa Ribera y Otros" perteneciente al ayuntamiento. Este recorrido permite adentrarse en un entorno fluvial bien conservado, donde la vegetación de ribera y las formaciones forestales propias del monte aledaño generan un hábitat de gran interés para fauna muy diversa. En este enclave es posible observar una variada comunidad de aves ligadas al medio ripario, así como especies propias de ambientes forestales.



Aves destacadas



Phalacrocorax carbo
Cormorán grande
Great Cormorant

Ave de coloración general negruzca, salvo la garganta, que es de tonos blanquecinos. Tiene el cuello largo y grueso y el pico prominente y gris.

Ave de la familia de los pájaros carpinteros, con plumaje de tonos grises, marrones y negros. Su alimentación es insectívora, basada en hormigas, y puede girar su cuello casi 180°, imitando a una serpiente.



Jynx torquilla
Torcecuello euroasiático
Eurasian Wryneck



Pyrhacorax pyrrhacorax
Chova piquirroja
Red-billed Chough

Córido de tamaño mediano de plumaje negro brillante. Posee un característico pico rojo intenso, largo y curvado, y patas de coloración igualmente rojiza. Es gregaria y excelente acróbata.

Córido de iris blanquecino, nuca grisácea y con gran inteligencia social. Forma complejas colonias, muestra fidelidad a su pareja de por vida y se adapta perfectamente a la vida urbana.



Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Y también...



Otus scops
Autillo europeo
Eurasian Scops Owl



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Milvus milvus
Milano real
Red Kite



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Mareca strepera
Ánade friso
Gadwall




Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Madrid

Observatorio ubicado en un parque urbano de la ciudad de Madrid, integrado en el interior del extenso pinar del Parque del Oeste. La observación se orienta hacia comederos y bebederos que favorecen la presencia y cercanía de diversas especies de aves ligadas a entorno urbano. El acceso se realiza a través de amplios caminos de tierra, fácilmente transitables, y el enclave cuenta con una buena conexión mediante transporte público, lo que facilita su visita.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 438130 Y: 4476230

Aves destacadas



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff

Pequeña ave insectívora de tonos verdosos y pardo grisáceos, con el pico afilado y las patas oscuras. Captura insectos entre la vegetación que le da cobijo.



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker

Pájaro carpintero de color verde, al volar permite ver el amarillo de su obispillo. Emite sonidos en forma de relinchos y risas que delatan su presencia. Se alimenta en gran parte de hormigas.



Passer montanus
Gorrión molinero
Eurasian Tree Sparrow

El más pequeño de los gorriónes de España. Presenta una mancha negra en la mejilla blanca, lo que ayuda a identificarlo. Esta especie no tiene dimorfismo sexual.



Aegithalos caudatus
Mito común
Long-tailed Tit

Ave pequeña inconfundible por su cola larga a la que se une un cuerpo redondeado. Está en comunicación constante con los miembros de su grupo.



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch

Paseriforme de pico robusto adaptado a una dieta granívora. Su cuerpo mantiene tonos verdes homogéneos y sus alas se ven decoradas de grises y amarillos.

Y también...



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw



Milvus milvus
Milano real
Red Kite



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Passer domesticus
Gorrión común
House Sparrow



Pica pica
Urraca común
Eurasian Magpie



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker




Coccothraustes coccothraustes
Picogordo común
Hawfinch

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Casa de Campo (Madrid)

El Cerro Garabitas constituye uno de los puntos de observación más destacados de la Casa de Campo, ofreciendo una panorámica amplia del mayor pulmón verde de Madrid y de la ciudad al fondo. Desde este punto elevado podrás observar el vuelo de emblemáticas aves forestales, además de otras especies que habitan en el entorno. En primavera y otoño también es habitual ver aves migratorias que utilizan el parque como área de descanso.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 435938 Y:4476260

Aves destacadas



Accipiter gentilis
Azor común
Northern Goshawk

Rapaz de vuelo ágil entre bosques densos, ojos amarillos intensos y ceja blanca marcada. Es un depredador implacable de alas cortas y cola larga, adaptado para cazar aves y mamíferos medianos entre la foresta.



Milvus milvus
Milano real
Red Kite

Fácilmente reconocible por su cola ahorquillada y sus colores rojizos en el pecho y blanco contrastado en las alas. Está presente todo el año pero sus números aumentan en invierno.



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle

En vuelo contrasta el blanco del vientre e interior de las alas con el borde negro del exterior de estas. Se identifica por una mancha blanca entre el cuello y el hombro.



Athene noctua
Mochuelo europeo
Little Owl

Pequeña rapaz nocturna de formas rechonchas, con cabeza carente de penachos y plumaje en tonos marrones y grisáceos. El vuelo es rápido y marcadamente ondulado.



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

Águila robusta. Es generalmente más oscura que el águila real lo que contrasta con sus hombros decorados de blanco. Los ejemplares jóvenes son de un color pardo más claro.


Y también...



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie



Coccothraustes coccothraustes
Picogordo común
Hawfinch



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw



Passer montanus
Gorrión molinero
Eurasian Tree Sparrow



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture





Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Casa de Campo (Madrid)

Este itinerario de 1 km recorre uno de los rincones más tranquilos del gran bosque urbano de Madrid. El camino atraviesa un pinar mediterráneo bien conservado, en el entorno del arroyo de la Zarza, perfecto para descubrir múltiples aves forestales sin alejarse de la ciudad. En primavera y otoño, este enclave también se convierte en un buen lugar para observar aves migratorias que utilizan la Casa de Campo como zona de descanso.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 435302 Y: 4474865

Aves destacadas



Sitta europaea
Trepador azul
Eurasian Nuthatch

Pequeña ave forestal de dorso gris azulado, vientre ocre y lista negra ocular, que habita bosques maduros. Es insectívoro en primavera y verano; pero en otoño e invierno consume semillas y frutos secos que almacena en grietas.

Rapaz de vuelo ágil entre bosques densos, ojos amarillos intensos y ceja blanca marcada. Es un depredador implacable de alas cortas y cola larga, adaptado para cazar aves y mamíferos medianos entre la foresta.



Accipiter gentilis
Azor común
Northern Goshawk



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle

En vuelo contrasta el blanco del vientre e interior de las alas con el borde negro del exterior de estas. Se identifica por una mancha blanca entre el cuello y el hombro.



Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron

Garza crepuscular y nocturna que frecuenta humedales, donde pesca peces y anfibios. Nidifica en árboles. Presente en primavera y verano en muchas zonas húmedas españolas.

Y también...



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Egretta garzetta
Garceta común
Little Egret



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Coccothraustes coccothraustes
Picogordo común
Hawfinch



Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Madrid

Recorrido de 3,5 km de ida y vuelta que se adentra en el Monte de El Pardo desde un acceso próximo al aparcamiento de la Portillera del Tambor hasta el área recreativa de La Nava, atravesando un paisaje característico de encinar mediterráneo con claros de pastizal. Este enclave, de gran valor ecológico, alberga poblaciones de ungulados, destacando el gamo y el ciervo, fácilmente observables en zonas abiertas durante las horas de menor actividad humana y sobre todo durante la berrea entre septiembre y octubre. El jabalí, más discreto, es también frecuente, siendo detectable por sus abundantes señales en el terreno.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 437287 Y:4484999

Especies destacadas




Cervus elaphus
Ciervo rojo
Red Deer

Ungulado salvaje de mayor tamaño de la Península Ibérica. Se caracteriza por las astas ramificadas de los machos. Al final del verano e inicio del otoño se puede oír la berrea de los machos.

Cérvido de mediano tamaño fácilmente reconocible por su librea negra y blanca en su parte trasera. Los machos tienen las astas en forma de palas con puntas. En primavera su pelaje se cubre de motas blancas.



Dama dama
Gamo europeo
European Fallow Deer



Sus scrofa
Jabalí
Wild boar

Especie salvaje de la que desciende el cerdo doméstico. Es un animal gregario, las hembras forman grupos sociales estables. Es una especie de actividad nocturna y crepuscular.

Fácilmente reconocible por su cola ahorquillada y sus colores rojizos en el pecho y blanco contrastado en las alas. Está presente todo el año pero sus números aumentan en invierno.



Milvus milvus
Milano real
Red kite



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

Águila robusta. Es generalmente más oscura que el águila real lo que contrasta con sus hombros decorados de blanco. Los ejemplares jóvenes son de un color pardo más claro.

Y también...



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Pica pica
Urraca común
Eurasian Magpie



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Athene noctua
Mochuelo europeo
Little Owl



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Bubo bubo
Búho real
Eurasian Eagle-Owl




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Majadahonda

Itinerario de 600 metros que discurre por el monte de Utilidad Pública "Dehesa de Majadahonda" perteneciente al ayuntamiento, un espacioso bosque adeshado caracterizado por la presencia de encinas, fresnos y zonas de pastizal. Este recorrido, de fácil acceso y escasa dificultad, permite una inmersión directa en un entorno natural de elevado interés ecológico dentro del ámbito periurbano. A lo largo del trayecto es posible observar una variada comunidad de aves asociadas tanto a medios forestales como a zonas abiertas.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 423747 Y: 4480240

Aves destacadas



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

Buitre de tonos pardos que llama la atención por su gran tamaño. Es el más común de los buitres de Madrid. La gorguera de plumas de su cuello cambia de color con la edad, pasando del pardo de los juveniles al blanco de los adultos.



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle

En vuelo contrasta el blanco del vientre e interior de las alas con el borde negro del exterior de estas. Se identifica por una mancha blanca entre el cuello y el hombro.



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe

Inconfundible por su cresta, que puede elevar a voluntad. Es un ave típica de encinares y dehesas. Emplea su fino pico para capturar invertebrados.



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater

Ave muy llamativa por sus exóticos colores dorados y turquesas, especializada en cazar insectos en vuelo. Anida en taludes y agujeros en el suelo durante el periodo estival.



Buteo buteo
Busardo ratonero
Common Buzzard

Rapaz de tamaño medio, plumaje muy variable (marrón a blanquecino) y alas anchas. Es un cazador oportunista que se alimenta de pequeños mamíferos, aves, reptiles y carroña.

Y también...



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Accipiter gentilis
Azor común
Northern Goshawk



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Periparus ater
Carbonero garrapinos
Coal Tit



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Passer montanus
Gorrión molinero
Eurasian Tree Sparrow



Lophophanes cristatus
Herrerillo capuchino
European Crested Tit



Hirundo rustica
Golondrina común
Barn Swallow




Curruca melanocephala
Curruca cabecinegra
Sardinian Warbler

● Residente ● Estival ● Invernante



Ubicación: Manzanares El Real

Observatorios ubicados en la Cañada Real Segoviana, en la orilla noroeste del embalse de Santillana. Su emplazamiento permite realizar observaciones próximas de la fauna ligada a las orillas, así como disfrutar de una amplia panorámica sobre la zona de aguas profundas, favoreciendo el avistamiento de aves residentes y de aquellas en paso migratorio. El acceso se realiza mediante un recorrido a pie de aproximadamente 500 metros desde el área urbana más cercana.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 427806 Y: 4509059

Aves destacadas




Tadorna tadorna
Tarro blanco
Common Shelduck

Anátida de tamaño mediano. Es de colores llamativos por lo contrastado de su librea blanca y negra, atravesada por una franja pectoral de color castaño, y un pico con protuberancia roja muy característica en machos.

Pequeño y activo. Se le suele observar correteando con rapidez por las orillas. Su anillo ocular amarillo contrasta con su antifaz negro.



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De llamativos colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Garza de pequeño tamaño. Cuenta con un penacho estriado de largas plumas sobre su cabeza. Especie escasa que suele encontrarse cerca de la vegetación palustre.



Ardeola ralloides
Garcilla cangrejera
Squacco Heron



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojo y negro de su cuerpo.

Y también...



Mareca strepera
Ánade friso
Gadwall



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Chroicocephalus ridibundus
Gaviota reidora
Black-headed Gull



Larus fuscus
Gaviota sombría
Lesser Black-backed Gull



Podiceps nigricollis
Zampullín cuellinegro
Black-necked Grebe



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe

● Residente ● Estival ● Invernante ● De paso

Ubicación: Manzanares El Real

Este punto de observación se sitúa en la cola del embalse de Santillana, un enclave estratégico para el avistamiento de aves al ofrecer extensas zonas de aguas someras y vegetación asociada que atraen a numerosas especies. En este entorno, de elevada biodiversidad, es posible observar tanto aves nidificantes, como invernantes o de paso, en función de la época del año. El acceso se realiza mediante un recorrido a pie de aproximadamente 1.200 metros desde la zona urbana más cercana.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 426514 Y:4507776

Aves destacadas




Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron

Garza crepuscular y nocturna que frecuenta humedales, donde pesca peces y anfibios. Nidifica en árboles. Presente en primavera y verano en muchas zonas húmedas españolas.

Pequeño y activo. Se le suele observar correteando con rapidez por las orillas. Su anillo ocular amarillo contrasta con su antifaz negro.



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De llamativos colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Garza de pequeño tamaño. Cuenta con un penacho estriado de largas plumas sobre su cabeza. Especie escasa que suele encontrarse cerca de la vegetación palustre.



Ardeola ralloides
Garcilla cangrejera
Squacco Heron



Egretta garzetta
Garceta común
Little Egret

Garza blanca de mediano tamaño que suele estar posada en las orillas esperando cazar su alimento. Fácilmente reconocible por sus dedos de color amarillo.

Y también...



Himantopus himantopus
Cigüeñuela común
Black-winged Stilt



Aythya fuligula
Porrón moñudo
Tufted Duck



Tadorna tadorna
Tarro blanco
Common Shelduck



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Chroicocephalus ridibundus
Gaviota reidora
Black-headed Gull



Larus fuscus
Gaviota sombría
Lesser Black-backed Gull



Podiceps nigricollis
Zampullín cuellinegro
Black-necked Grebe




Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe

● Residente ● Estival ● Invernante ● De paso


Ubicación: Meco

Itinerario de aproximadamente 1,6 km de longitud, con inicio en el municipio de Meco y recorrido de ida y vuelta por la Cañada Real Galiana en dirección a Camarma de Esteruelas. Este trayecto discurre por un paisaje abierto característico de la campiña, dominado por campos de cultivo, lo que favorece la presencia de aves propias de medios agrícolas muy desconocidas para gran parte de la población. Su trazado, prácticamente llano y de escasa dificultad, lo convierte en una ruta fácil e idónea para la observación de aves esteparias.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 469896 Y: 4488184

Aves destacadas



Otis tarda
Avutarda euroasiática
Great Bustard

Ave inconfundible, de gran tamaño. Habitante característico de las extensas llanuras cerealistas. Las hembras son de menor tamaño y lucen un plumaje algo más apagado.

Especie gregaria. En primavera, durante el celo, los machos destacan por sus exhibiciones y cantos, contrastando los collares blancos contra el negro de su cuello.



Tetrax tetrax
Sisón común
Little bustard



Milvus milvus
Milano real
Milano real

Fácilmente reconocible por su cola ahorquillada y sus colores rojizos en el pecho y blanco contrastado en las alas. Está presente todo el año pero sus números aumentan en invierno.



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite



Circus pygargus
Aguilucho cenizo
Montagu's Harrier

Ave rapaz de tamaño medio. Presenta dimorfismo sexual, siendo los machos bastante claros y las hembras de mayor tamaño y de tonos parduzcos. Habita en grandes herbazales.

Y también...



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Alauda arvensis
Alondra común
Eurasian Skylark



Burhinus oedicnemus
Alcaraván común
Eurasian Stone-curlew



Athene noctua
Mochuelo europeo
Little Owl



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Buteo buteo
Busardo ratonero
Common Buzzard



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Mejorada del Campo

Observatorio abierto orientado hacia las zonas húmedas situadas entre el río Henares y los cortados yesíferos del sector oriental en el paraje de "Las Islillas". Antiguas graveras que hoy albergan una notable diversidad de aves acuáticas, limícolas y rapaces ligadas a medios húmedos. Las lagunas, rodeadas de vegetación palustre y zonas de ribera, ofrecen un entorno tranquilo ideal para la observación de fauna durante todo el año. Este espacio está siendo objeto de restauración impulsado por WWF para mejorar el hábitat y favorecer la biodiversidad asociada al humedal.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 458230 Y: 4473208

Aves destacadas



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.

Aparece en el periodo estival para ocupar los carrizales. Es un ave muy ruidosa, observable mientras canta posada sobre el carrizo. Es de mayor tamaño que el carricero común.



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Remiz pendulinus
Pájaro moscón europeo
Eurasian Penduline Tit

Pequeño passeriforme con preferencia por la vegetación de ribera, en la cual se ubica su nido colgante. Detectable por su aguda llamada y su llamativo antifaz negro.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern

Habita carrizales y vegetación densa. Es un migrador transahariano aumentando su presencia en primavera, siendo esta muy baja en invierno. Muy discreto, suele detectarse por su canto profundo y repetitivo.

Y también...



Mareca strepera
Ánade friso
Gadwall



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Bubo bubo
Búho real
Eurasian Eagle-Owl



Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Common Reed Warbler



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale

● Residente ● Estival ● Invernante



Ubicación: Miraflores de la Sierra

Este punto de observación se localiza a más de 1.700 metros de altitud, en un entorno característico de media-alta montaña que combina pastizales y matorrales, rodeados por extensas formaciones de pinar. Este mosaico de hábitats genera condiciones óptimas para la presencia de una variada comunidad faunística, incluyendo especies propias de ambientes de montaña y otras de difícil observación en cotas más bajas, lo que convierte este enclave en un punto frontera especialmente atractivo para la observación de aves forestales.



Aves destacadas



Emberiza cia
Escribano montesino
Rock Bunting

Paseriformes de cuerpo pardo rojizo y cabeza gris, donde contrastan sus líneas faciales negras. Se encuentra generalmente en zonas de matorral de montaña.



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

Buitre de tonos pardos que llama la atención por su gran tamaño. Es el más común de los buitres de Madrid. La gorguera de plumas de su cuello cambia de color con la edad, pasando del pardo de los juveniles al blanco de los adultos.



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.



Prunella collaris
Acentor alpino
Alpine accentor

Paseriforme típico de hábitats montañosos, tanto en prados como en roquedos. Combina el color gris con el pardo rojizo, que contrasta con el blanco y el negro de sus plumas cobertoras.



Carduelis citrinella
Verderón serrano
Citrl Finch

De un tono verdoso amarillento general, se reconoce porque su nuca y los lados del cuello son grises. Le gustan los bosques de montaña, picoteando en prados y matorral.

Y también...



Pyrhcorax pyrrhcorax
Chova piquirroja
Red-billed Chough



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Alauda arvensis
Alondra común
Eurasian Skylark



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Monticola solitarius
Roquero solitario
Blue Rock Thrush



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite



Ubicación: Navacerrada – Cercedilla

Ruta de ida y vuelta, con una distancia total de 3,5 km, que parte del Puerto de Navacerrada y asciende en dirección al Alto de Guarramillas para desviarse posteriormente hacia la zona de Emburriaderos. A lo largo del recorrido, especialmente desde las cotas más elevadas, se obtienen vistas panorámicas destacadas del hueco de Siete Picos, el valle del Navalmedio y el valle de La Barranca, con la imponente silueta de La Maliciosa dominando el paisaje.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 415479 Y:4515672

Especies destacadas



Capra pyreinaica
Cabra montés
Spanish Ibex

Íbice endémico, con machos corpulentos y con grandes y anchos cuernos. Con los años, el animal va añadiendo anillos a la cornamenta. El pelaje de los machos ennegrece con la edad.

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Luscinia svecica
Ruiseñor pechiazul
Bluethroat

Pequeño ruiseñor con babero azul cobalto en los machos, a menudo con una medalla central. Es un ave insectívora de canto melodioso, que cría en piornales de Guadarrama y Somosierra.

De un tono verdoso amarillento general, se reconoce porque su nuca y los lados del cuello son grises. Le gustan los bosques de montaña, picoteando en prados y matorral.



Carduelis citrinella
Verderón serrano
Citril Finch



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle

En vuelo contrasta el blanco del vientre e interior de las alas con el borde negro del exterior de estas. Se identifica por una mancha blanca entre el cuello y el hombro.

Y también...



Prunella collaris
Acentor alpino
Alpine Accentor



Falco subbuteo
Alcotán europeo
Eurasian Hobby



Circaetus gallicus
Culebrera europea
Short-toed Snake Eagle



Fringilla coelebs
Pinzón vulgar
Common Chaffinch



Falco peregrinus
Halcón peregrino
Peregrine Falcon



Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chova piquirroja
Red-billed Chough



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Milvus milvus
Milano real
Red Kite





Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Pozuelo de Alarcón

Amplio espacio verde acondicionado como parque forestal, dotado de diversas vías y paseos que facilitan su uso como área de ocio y recreo. Además de su riqueza botánica, el parque cuenta con dos estanques artificiales, uno de los cuales alberga un observatorio. Estas masas de agua actúan como focos de atracción para numerosas especies de aves, incrementando el interés del enclave para la observación directa de la fauna que usa el estanque.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 434347 Y: 4476356

Aves destacadas



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle

En vuelo contrasta el blanco del vientre e interior de las alas con el borde negro del exterior de estas. Se identifica por una mancha blanca entre el cuello y el hombro.



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

Fácilmente avistable durante primavera y verano. Especie migratoria que cría en la Península Ibérica durante el periodo estival. En general es de color más oscuro que el milano real y con las plumas de la cola menos ahorquilladas.



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork

Ave inconfundible por su plumaje blanco contrastado por el negro de sus alas y el rojo de su pico y patas. Especie común todo el año, con individuos que vienen a invernar a la región.



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe

Ave acuática de pequeño tamaño. Reproductor e invernante muy común. Aparece y desaparece en la superficie del agua con sus zambullidas.



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater

Ave muy llamativa por sus exóticos colores dorados y turquesas, especializada en cazar insectos en vuelo. Anida en taludes y agujeros en el suelo durante el periodo estival.

Y también...



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian Golden Oriole



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Dryobates minor
Pico menor
Lesser Spotted Woodpecker



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Athene noctua
Mochuelo europeo
Little Owl



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon




Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Rascafría

Ruta circular de 12,5 km de longitud que parte y finaliza en el aparcamiento de Las Presillas, recorriendo algunos de los paisajes más emblemáticos del Valle del Lozoya. El itinerario permite disfrutar de bosques de roble melojo, vegetación de ribera y enclaves de interés como el Monasterio de El Paular. Destaca especialmente el mirador de Los Robledos, uno de los puntos panorámicos más espectaculares del Parque Nacional, siendo además un excelente punto de observación de fauna.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 425786 Y: 4525945

Especies destacadas




Cinclus cinclus
Mirlo acuático europeo
White-throated Dipper

Ave rechoncha, de plumaje pardo con un llamativo babero blanco. Habita ríos y arroyos limpios de corrientes rápidas. Es un cazador subacuático singular que se alimenta de insectos, pequeños crustáceos y moluscos.

Mustélido de cuerpo fusiforme y aerodinámico, patas palmeadas y pelaje pardo e impermeable. Es un cazador acuático solitario y territorial, capaz de detectar vibraciones bajo el agua gracias a sus sensibles bigotes.




Lutra lutra
Nutria paleártica
Eurasian otter



Capreolus capreolus
Corzo
European Roe Deer

Pequeño cérvido de pelaje pardo-rojizo, y grisáceo en invierno, con característicos cuernos cortos en los machos. Habita bosques abiertos y zonas agrícolas. De hábitos crepusculares y solitarios.

Especie salvaje de la que desciende el cerdo doméstico. Es un animal gregario, las hembras forman grupos sociales estables. Es una especie de actividad nocturna y crepuscular.



Sus scrofa
Jabalí
Wild boar



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.

Y también...



Sitta europaea
Trepador azul
Eurasian Nuthatch



Buteo buteo
Busardo ratonero
Common Buzzard



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie



Periparus ater
Carbonero garrapinos
Coal Tit



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Fringilla coelebs
Pinzón vulgar
Common Chaffinch



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Rascafría

Ruta de suave ascenso que parte del Puerto de la Morcuera y conduce hasta una de las alineaciones montañosas más representativas de la Sierra de Guadarrama. El itinerario, de ida y vuelta y con una distancia total de 8,2 km, alcanza la Loma de Bailanderos, un punto elevado que ofrece una panorámica privilegiada del Valle de El Páucar y de la solana del Parque Nacional. Se trata de un enclave especialmente frecuentado por la cabra montés durante los meses estivales.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 429846 Y: 4520001

Especies destacadas



Capra pyreinaica
Cabra montés
Spanish Ibex

Íbice endémico, con machos corpulentos y con grandes y anchos cuernos. Con los años, el animal va añadiendo anillos a la cornamenta. El pelaje de los machos ennegrece con la edad.

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

Buitre de tonos pardos que llama la atención por su gran tamaño. Es el más común de los buitres de Madrid. La gorguera de plumas de su cuello cambia de color con la edad, pasando del pardo de los juveniles al blanco de los adultos.

Paseriforme típico de hábitats montañosos, tanto en prados como en roquedos. Combina el color gris con el pardo rojizo, que contrasta con el blanco y el negro de sus plumas cobertoras.



Prunella collaris
Acentor alpino
Alpine accentor



Luscinia svecica
Ruiseñor pechiazul
Bluethroat

Pequeño ruiseñor con babero azul cobalto en los machos, a menudo con una medalla central. Es un ave insectívora de canto melodioso, que cría en pitorrales de Guadarrama y Somosierra.

Y también...



Carduelis citrinella
Verderón serrano
Citril Finch



Coturnix coturnix
Codorniz común
Common Quail



Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chova piquirroja
Red-billed Chough



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Passer domesticus
Gorrión común
House Sparrow



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Circaetus gallicus
Culebrera europea
Short-toed Snake Eagle



Milvus milvus
Milano real
Red Kite





Falco peregrinus
Halcón peregrino
Peregrine Falcon

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Rascafría

Ruta lineal de ida y vuelta, con una distancia total de 10.2 km y un desnivel acumulado de 610m, que parte del Puerto de Los Cotos y asciende hasta la cumbre más alta de la Sierra de Guadarrama: el pico de Peñalara. El itinerario discurre mayoritariamente por pista forestal, excepto en el tramo final, donde el sendero se estrecha y adquiere un carácter más montaño. A lo largo del recorrido se disfrutan excelentes panorámicas. Debido a su altitud, la ruta puede presentar dificultades en invierno. Se recomienda informarse previamente en el Centro de Visitantes Peñalara y consultar la normativa vigente del macizo antes de realizarla.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 418968 Y: 4519773

Especies destacadas



Capra pyreinaica
Cabra montés
Spanish Ibex

Íbice endémico, con machos corpulentos y con grandes y anchos cuernos. Con los años, el animal va añadiendo anillos a la cornamenta. El pelaje de los machos ennegrece con la edad.

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

Buitre de tonos pardos que llama la atención por su gran tamaño. Es el más común de los buitres de Madrid. La gorguera de plumas de su cuello cambia de color con la edad, pasando del pardo de los juveniles al blanco de los adultos.

De un tono verdoso amarillento general, se reconoce porque su nuca y los lados del cuello son grises. Le gustan los bosques de montaña, picoteando en prados y matorral.



Carduelis citrinella
Verderón serrano
Citril Finch



Periparus ater
Carbonero garrapinos
Coal Tit

Pequeña ave forestal de cabeza negra y mancha blanca en la nuca. Habitual en bosques de coníferas y zonas montañosas, destaca por su pico fino y cuerpo compacto. Es insectívoro en verano y granívoro en invierno.

Y también...



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Falco subbuteo
Alcotán europeo
Eurasian Hobby



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Fringilla coelebs
Pinzón vulgar
Common Chaffinch



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Milvus milvus
Milano real
Red Kite



Circaetus gallicus
Culebrera europea
Short-toed Snake Eagle





Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Humedal de gran riqueza natural, faunística y geológica, originado a partir de antiguas actividades extractivas. Este enclave se sitúa entre cantiles yesíferos terciarios y el río Jarama, configurando un entorno singular que sirve de refugio a una elevada diversidad de fauna. El acceso se realiza a pie desde el núcleo urbano de Rivas-Vaciamadrid. El observatorio se encuentra ubicado en la orilla norte de la laguna, ofreciendo una posición privilegiada para la observación de la biodiversidad del humedal.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 457375 Y: 4463616

Aves destacadas



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler

Anátida abundante en invierno con preferencia por las aguas calmas de lagunas y graveras. Inconfundible por su característico pico en forma de espátula.

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.




Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail

Pequeña gruiforme con pico alargado y rojizo, de canto estridente. Se suele ocultar entre la vegetación de las zonas húmedas.

Y también...



Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Common Reed Warbler



Riparia riparia
Avión zapador
Sand Martin



Chroicocephalus ridibundus
Gaviota reidora
Black-headed Gull



Larus fuscus
Gaviota sombría
Lesser Black-backed Gull



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Alcedo atthis
Martín pescador
Common Kingfisher



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe




Mauremys leprosa
Galápago leproso
Mediterranean Pond Turtle

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Laguna situada en un enclave privilegiado de confluencia de los ríos Jarama y Manzanares y rodeada por una densa vegetación de ribera que proporciona refugio a una gran diversidad de fauna silvestre ligada a la presencia de agua. El espacio cuenta con una red de caminos que circundan la laguna, así como varios observatorios que facilitan la contemplación de la avifauna. El acceso puede realizarse a pie o en bicicleta desde el aparcamiento habilitado cerca de la carretera o desde Rivas-Vaciamadrid.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 454926 Y: 4462616

Aves destacadas



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal

La más pequeña de las anátidas ibéricas. De carácter reservado. El macho tiene una llamativa cabeza rojiza con antifaz verde que junto a su popa amarilla le hacen destacar.

Aparece y desaparece sumergiéndose. Se diferencia del zampullín común por sus peñachos dorados y el cuello negro en periodo reproductor y sus tonalidades blancas y negras en invierno.



Podiceps nigricollis
Zampullín cuellinegro
Black-necked Grebe



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphe

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Alcedo atthis
Martín pescador común
Common Kingfisher

Llamativo por su color azul turquesa, pico largo que usa para pescar y su metálico y estridente reclamo. Se posa en carrizos o ramas bajas desde donde se lanza en picado a pescar. Habitual de los ríos y humedales madrileños.

Y también...



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler




Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard

● Residente ● Estival ● Invernante



Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Laguna situada en un enclave privilegiado de confluencia de los ríos Jarama y Manzanares y rodeada por una densa vegetación de ribera que proporciona refugio a una gran diversidad de fauna silvestre ligada a la presencia de agua. El espacio cuenta con una red de caminos que circundan la laguna, así como varios observatorios que facilitan la contemplación de la fauna. El acceso puede realizarse a pie o en bicicleta desde el aparcamiento habilitado cerca de la carretera o desde Rivas-Vaciamadrid.



Coordenadas UTM (ETRS89) X:455171 Y:4462591

Aves destacadas



Oxyura leucocephala
Malvasía cabeciblanca
White-headed Duck

Pato buceador identificable por su cabeza robusta y sus plumas de la cola largas y afiladas, que suele mantener erguidas. Durante la reproducción, el macho tiene el pico de un llamativo color azul.

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.

Marcado dimorfismo sexual. El plumaje nupcial del macho contrasta con el rostro y cresta rojizos contra el cuello negro. Mantiene el pico colorado durante todo el año.



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojizo y negro de su cuerpo.

Y también...



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Alcedo atthis
Martín pescador
Common Kingfisher



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Jynx torquilla
Torcecuello euroasiático
Eurasian Wryneck




Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Laguna situada en un enclave privilegiado de confluencia de los ríos Jarama y Manzanares y rodeada por una densa vegetación de ribera que proporciona refugio a una gran diversidad de fauna silvestre ligada a la presencia de agua. El espacio cuenta con una red de caminos que circundan la laguna, así como varios observatorios que facilitan la contemplación de la fauna. El acceso puede realizarse a pie o en bicicleta desde el aparcamiento habilitado cerca de la carretera o desde Rivas-Vaciamadrid.



Coordenadas UTM (ETRS89) X:455126 Y:4462552

Aves destacadas



Oxyura leucocephala
Malvasía cabeciblanca
White-headed Duck

Pato buceador identificable por su cabeza robusta y sus plumas de la cola largas y afiladas, que suele mantener erguidas. Durante la reproducción, el macho tiene el pico de un llamativo color azul.

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Podiceps nigricollis
Zampullín cuellinegro
Black-necked Grebe

Aparece y desaparece sumergiéndose. Se diferencia del zampullín común por sus penachos dorados y el cuello negro en periodo reproductor y sus tonalidades blancas y negras en invierno.

Marcado dimorfismo sexual. El plumaje nupcial del macho contrasta con el rostro y cresta rojizos contra el cuello negro. Mantiene el pico colorado durante todo el año.



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojo y negro de su cuerpo.

Y también...



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Alcedo atthis
Martín pescador
Common Kingfisher



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Jynx torquilla
Torcecuello euroasiático
Eurasian Wryneck




Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover

● Residente ● Estival ● Invernante



Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Laguna situada en un enclave privilegiado de confluencia de los ríos Jarama y Manzanares y rodeada por una densa vegetación de ribera que proporciona refugio a una gran diversidad de fauna silvestre ligada a la presencia de agua. El espacio cuenta con una red de caminos que circundan la laguna, así como varios observatorios que facilitan la contemplación de la fauna. El acceso puede realizarse a pie o en bicicleta desde el aparcamiento habilitado cerca de la carretera o desde Rivas-Vaciamadrid.



Coordenadas UTM (ETRS89) X:455294 Y:4462780

Aves destacadas



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal

La más pequeña de las anátidas ibéricas. De carácter reservado. El macho tiene una llamativa cabeza rojiza con antifaz verde que junto a su popa amarilla le hacen destacar.



Podiceps nigricollis
Zampullín cuellinegro
Black-necked Grebe

Aparece y desaparece sumergiéndose. Se diferencia del zampullín común por sus peñachos dorados y el cuello negro en periodo reproductor y sus tonalidades blancas y negras en invierno.



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphehen

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler

Aparece en el periodo estival para ocupar los carrizales. Es un ave muy ruidosa, observable mientras canta posada sobre el carrizo. Es de mayor tamaño que el carricero común.



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojizo y negro de su cuerpo.

Y también...



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Alcedo atthis
Martín pescador
Common Kingfisher



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Jynx torquilla
Torcecuello euroasiático
Eurasian Wryneck




Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover

● Residente ● Estival ● Invernante



Ubicación: San Fernando de Henares

El observatorio se ubica junto a una charca creada específicamente como hábitat para anfibios en el Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares, siendo necesario gestionar previamente el permiso de acceso a través del propio centro. El acceso se realiza dejando el vehículo en el aparcamiento del centro. Las visitas se desarrollan exclusivamente en el marco de actividades organizadas, por lo que se recomienda consultar la programación en el Centro de Educación Ambiental "Caserío de Henares".



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 458859 Y: 4474849

Especies destacadas



Pelophylax perezi
Rana verde común
Iberian Water Frog

Especie de rana originaria de las regiones ibéricas y francesas. Es un anfibio fácil de observar por su tendencia a asolearse en las orillas. En época estival es común escuchar su canto.

Quelonio con caparazón alargado y deprimido, verde-pardo con manchas pardo rojizas, que se van difuminando con la edad. Destaca una mancha circular, naranja o amarilla, en la cabeza.



Mauremys leprosa
Galápago leproso
Mediterranean Pond Turtle



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff

Pequeña ave insectívora de tonos verdosos y pardo grisáceos, con el pico afilado y las patas oscuras. Captura insectos entre la vegetación que le da cobijo.

Ave de cuerpo negro uniforme en los machos y pardo oscuro en las hembras, con pico naranja. Habitual de jardines y suelos con sombra y cierta humedad donde busca lombrices.



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch

Paseriforme de pico robusto adaptado a una dieta granívora. Su cuerpo mantiene tonos verdes homogéneos y sus alas se ven decoradas de grises y amarillos.

Y también...



Bufo spinosus
Sapo común
Spiny Toad



Epidalea calamita
Sapo corredor
Natterjack Toad



Pelodytes punctatus
Sapillo moteado
Common Parsley Frog



Pleurodeles waltl
Gallipato
Iberian Ribbed Newt



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit



Riparia riparia
Avión zapador
Sand Martin



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: San Fernando de Henares

El observatorio se ubica en el humedal colindante con el Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares. Este espacio está formado por un conjunto de lagunas artificiales originadas por antiguas actividades extractivas sobre un meandro abandonado del río, lo que ha dado lugar a un enclave de elevada diversidad biológica. Las visitas se realizan en el marco de actividades organizadas, por lo que se recomienda consultar la programación en el Centro de Educación Ambiental "Caserío de Henares".



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 459206 Y: 4474805

Aves destacadas



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.

Ave acuática de pequeño tamaño. Reproductor e invernante muy común. Aparece y desaparece en la superficie del agua con sus zambullidas.



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater

Ave muy llamativa por sus exóticos colores dorados y turquesas, especializada en cazar insectos en vuelo. Anida en taludes y agujeros en el suelo durante el periodo estival.

Y también...



Mareca strepera
Ánade friso
Gadwall



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian Golden Oriole



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: San Fernando de Henares

El observatorio se ubica en el humedal colindante con el Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares. Este espacio está formado por un conjunto de lagunas artificiales originadas por antiguas actividades extractivas sobre un meandro abandonado del río, lo que ha dado lugar a un enclave de elevada diversidad biológica. Las visitas se realizan en el marco de actividades organizadas, por lo que se recomienda consultar la programación en el Centro de Educación Ambiental "Caserío de Henares".



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 459472 Y:4474513

Aves destacadas



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Ave acuática de pequeño tamaño. Reproductor e invernante muy común. Aparece y desaparece en la superficie del agua con sus zambullidas.



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron

Garza crepuscular y nocturna que frecuenta humedales, donde pesca peces y anfibios. Nidifica en árboles. Presente en primavera y verano en muchas zonas húmedas españolas.

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern

Habita carrizales y vegetación densa. Es un migrador transahariano aumentando su presencia en primavera, siendo esta muy baja en invierno. Muy discreto, suele detectarse por su canto profundo y repetitivo.

Y también...



Mareca strepera
Anade friso
Gadwall



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian Golden Oriole



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: San Fernando de Henares

El observatorio se ubica en el humedal colindante con el Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares. Este espacio está formado por un conjunto de lagunas artificiales originadas por antiguas actividades extractivas sobre un meandro abandonado del río, lo que ha dado lugar a un enclave de elevada diversidad biológica. Las visitas se realizan en el marco de actividades organizadas, por lo que se recomienda consultar la programación en el Centro de Educación Ambiental "Caserío de Henares".



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 459595 Y: 4474459

Aves destacadas



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard

Es un pato buceador. El macho tiene la cabeza parda rojiza con el ojo de un llamativo color rojo, tonos que contrastan con el negro de su pecho. Hacia final del verano pierde parte de su coloración.

Ave de coloración general negruzca, salvo la garganta, que es de tonos blanquecinos. Tiene el cuello largo y grueso y el pico prominente y gris.



Phalacrocorax carbo
Cormorán grande
Great Cormorant



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De llamativos colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Ave acuática de pequeño tamaño. Reproductor e invernante muy común. Aparece y desaparece en la superficie del agua con sus zambullidas.



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little grebe



Milvus migrans
Milano negro
Black kite

Fácilmente avistable durante la primavera y el verano, se trata de una especie migratoria que cría en la Península Ibérica durante el periodo estival. Es de color en general más oscuro que el milano real y con las plumas de la cola menos apuntadas.

Y también...




Mareca strepera
Ánade friso
Gadwall



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common chiffchaff



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian golden oriole



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Merops apiaster
Abejaruco europeo
European bee-eater

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: San Lorenzo de El Escorial

Punto de observación con impresionantes vistas desde el monte Abantos hacia El Escorial, con el Embalse de Valmayor de fondo. Además del paisaje natural, donde es posible observar el vuelo de imponentes rapaces forestales, este enclave ofrece una panorámica excepcional del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, integrando en un mismo punto la contemplación del patrimonio natural y cultural de la región. La subida desde el municipio de San Lorenzo de El Escorial puede realizarse desde distintos accesos, se recomienda ascender a pie por la Cañada Real Leonesa hasta el Alto de San Lorenzo y, desde allí, continuar el recorrido hasta el mirador del monte Abantos. Este itinerario permite disfrutar de un entorno forestal bien conservado dentro de un monte de Utilidad Pública propiedad del ayuntamiento.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 402426 Y: 4494965

Aves destacadas



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

Buitre de tonos pardos que llama la atención por su gran tamaño. Es el más común de los buitres de Madrid. La gorguera de plumas de su cuello cambia de color con la edad, pasando del pardo de los juveniles al blanco de los adultos.

En vuelo contrasta el blanco del vientre e interior de las alas con el borde negro del exterior de estas. Se identifica por una mancha blanca entre el cuello y el hombro.



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Milvus milvus
Milano real
Red Kite

Fácilmente reconocible por su cola ahorquillada y sus colores rojizos en el pecho y blanco contrastado en las alas. Está presente todo el año pero sus números aumentan en invierno.

Mariposa nocturna endémica de España y el sur de los Alpes franceses, que vive en bosques de coníferas. Destaca por sus grandes alas verde esmeralda con venas rojizas y ocelos de varios colores y largas colas.



Graellsia isabellae
Mariposa isabelina
Spanish Moon Moth



Buteo buteo
Busardo ratonero
Common Buzzard

Rapaz de tamaño medio, plumaje muy variable (marrón a blanquecino) y alas anchas. Es un cazador oportunista que se alimenta de pequeños mamíferos, aves, reptiles y carroña.

Y también...



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Cyanopica cooki
Rabalargo ibérico
Iberian Magpie



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Periparus ater
Carbonero garrapinos
Coal Tit



Lophophanes cristatus
Herrerillo capuchino
European Crested Tit



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Coccothraustes coccothraustes
Picogordo común
Hawfinch



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture




Circaetus gallicus
Culebrera europea
Short-toed Snake Eagle

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: San Martín de la Vega

Humedal constituido por un carrizal desarrollado sobre un antiguo meandro del río Jarama. Se trata de un enclave de elevado valor ornitológico, especialmente relevante como área de descanso y alimentación para aves migratorias, ya que su inundación temporal en determinados periodos del año favorece la presencia de especies poco frecuentes en la Comunidad de Madrid. Destaca por albergar especies de gran interés, como el carricerín cejudo, uno de los passeriformes más amenazados de Europa. Este humedal es también objeto de seguimiento y acciones de conservación por parte de SEO/BirdLife.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 452060 Y:4452325

Aves destacadas



Acrocephalus paludicola
Carricerín cejudo
Aquatic Warbler

Pequeña ave insectívora que habita carrizales y humedales someros con densa vegetación palustre. Es un pequeño pájaro pardo con un llamativo diseño de listas negras y una marcada ceja clara.

Limícola zanquilarga, estilizada y de tonos blanquinegros. Reproduce un grito repetitivo y penetrante. Además, cuando detecta peligro vuelan en grupo.



Himantopus himantopus
Cigüeñuela común
Black-winged Stilt



Remiz pendulinus
Pájaro moscón europeo
Eurasian Penduline Tit

Pequeño passeriforme con preferencia por la vegetación de ribera, en la cual se ubica su nido colgante. Detectable por su aguda llamada y su llamativo antifaz negro.

Aparece en el periodo estival para ocupar los carrizales. Es un ave muy ruidosa, observable mientras canta posada sobre el carrizo. Es de mayor tamaño que el carricero común.



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Emberiza schoeniclus
Escribano palustre
Common Reed Bunting

Ave muy llamativa por sus exóticos colores dorados y turquesas, especializada en cazar en vuelo. Como otras aves palustres, hace el nido entre el carrizo.

Y también...



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Common Reed Warbler



Ardeola ralloides
Garcilla cangrejera
Squacco Heron





Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover

● Residente ● Estival ● Invernante ● De paso



Ubicación: Santorcaz

Este mirador ofrece una amplia panorámica del paisaje característico de esta comarca: lomas suaves, campos de cultivo, barrancos yesíferos y manchas de matorral mediterráneo que conforman un entorno ideal para la fauna de medios abiertos. Desde este punto elevado es posible observar aves propias de la campiña, además de rapaces que patrullan el valle en busca de alimento. La amplitud del horizonte y la tranquilidad del entorno convierten este observatorio en un lugar perfecto para disfrutar del paisaje alcarreño y de la biodiversidad que lo habita. Este mirador forma parte de las actuaciones impulsadas por Aracove, Asociación de Desarrollo Local en la Comarca de las Vegas y la Campiña del Henares "Alcarria de Alcalá".



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 479808 Y: 4480252

Aves destacadas



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

Buitre de tonos pardos que llama la atención por su gran tamaño. Es el más común de los buitres de Madrid. La gorguera de plumas de su cuello cambia de color con la edad, pasando del pardo de los juveniles al blanco de los adultos.



Athene noctua
Mochuelo europeo
Little Owl

Pequeña rapaz nocturna de formas rechonchas, con cabeza carente de penachos y plumaje en tonos marrones y grisáceos. El vuelo es rápido y marcadamente ondulado.



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle

En vuelo contrasta el blanco del vientre e interior de las alas con el borde negro del exterior de estas. Se identifica por una mancha blanca entre el cuello y el hombro.



Bubo bubo
Búho real
Eurasian Eagle-Owl

Rapaz nocturna más grande de Europa. Posee un plumaje críptico de tonos leonados, pardos y marrones y unos penachos cefálicos característicos. Es un superdepredador muy versátil.



Aquila chrysaetos
Águila real
Golden Eagle

Imponente ave rapaz de gran envergadura y plumaje castaño oscuro con matices dorados en la nuca. Habita zonas montañosas y cantiles del hemisferio norte, donde caza con gran eficacia mamíferos y aves.

Y también...



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian Golden Oriole



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Circus aeruginosus
Águilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Hirundo rustica
Golondrina común
Barn Swallow



Alectoris rufa
Perdiz roja
Red-legged Partridge



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Titulcia

Observatorio orientado hacia el río Jarama, ubicado en el paisaje ribereño de su orilla este, con los cortados yesíferos como telón de fondo. La vegetación de ribera y el mosaico de hábitats presentes favorecen la presencia tanto de aves acuáticas como de especies forestales.

El acceso se realiza desde el municipio de Titulcia, mediante un recorrido a pie de aproximadamente 700 metros por una senda que discurre por el soto.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 451322 Y: 4443952

Aves destacadas



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard

Es un pato buceador. El macho tiene la cabeza parda rojiza con el ojo de un llamativo color rojo, tonos que contrastan con el negro de su pecho. Hacia final del verano pierde parte de su coloración.

Fácilmente avistable durante primavera y verano. Especie migratoria que cría en la Península Ibérica durante el periodo estival. En general es de color más oscuro que el milano real y con las plumas de la cola menos ahorquilladas.



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater

Ave muy llamativa por sus exóticos colores dorados y turquesas, especializada en cazar insectos en vuelo. Anida en taludes y agujeros en el suelo durante el periodo estival.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron

Garza de gran tamaño. De colores gris y blanco con penachos negros en la cabeza. Es habitual encontrarla posada en casi cualquier tipo de hábitat húmedo.

Y también...



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Riparia riparia
Avión zapador
Sand Martin



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker



Dryobates minor
Pico menor
Lesser Spotted Woodpecker



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian Golden Oriole




Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Torrejón de Velasco

Se trata de una fortaleza de origen medieval. Con el paso del tiempo y su progresivo desuso ha experimentado una notable transformación funcional, pasando de su primitiva condición de fortaleza defensiva y residencia señorial hasta convertirse en la actualidad en un enclave de valor patrimonial y ambiental. Hoy en día el castillo constituye un refugio para diversas especies de avifauna asociadas a entornos urbanos. Las recientes actuaciones de adecuación han contribuido a consolidar y mantener la presencia de aves nidificantes, entre las que destaca el cernícalo primilla, constituyendo este espacio uno de los más importantes primillares de la Comunidad de Madrid.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 433656 Y: 4448888

Aves destacadas



Falco naumanni
Cernícalo primilla
Lesser Kestrel

Ave estival con dependencia de las construcciones humanas al anidar. Cuando caza se mantiene cernido en vuelo mientras vigila el suelo. Se diferencia por el gris azulado presente en sus alas.



Streptopelia turtur
Tórtola europea
European Turtle Dove

Ave esbelta, con el dorso y los hombros anaranjados y moteados de negro, un collar de listas negras y blancas, la cabeza y el cuello de color gris azulado, y el pecho rosado.



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork

Ave inconfundible por su plumaje blanco contrastado por el negro de sus alas y el rojo de su pico y patas. Especie común todo el año, con individuos que vienen a invernar a la región.



Picus sharpei
Pito ibérico
Iberian Green Woodpecker

Pájaro carpintero de color verde, al volar permite ver el amarillo de su obispillo. Emite sonidos en forma de relinchos y risas que delatan su presencia. Se alimenta en gran parte de hormigas.



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon

Paloma de gran tamaño, identificable por el blanco del collar de su cuello y del borde de sus alas. Es una especie que ha colonizado con éxito los ambientes urbanos.

Y también...



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Passer domesticus
Gorrión común
House Sparrow



Sylvia atricapilla
Curruca capirotada
Eurasian Blackcap



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Torrelaguna

El punto de observación se sitúa en el área recreativa de Valgallego, desde donde es posible contemplar grandes rapaces forestales sobrevolando la zona entre las que destaca el águila imperial ibérica, así como ejemplares de buitre negro y leonado posados en las formaciones rocosas circundantes. Este espacio se ubica en un enclave natural caracterizado por la presencia de frondosos bosques y una notable riqueza faunística asociada a estos ecosistemas forestales. No olvides visitar el pueblo de Torrelaguna para culminar tu experiencia en este bonito entorno.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 451211 Y: 4521177

Aves destacadas



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

Buitre de tonos pardos que llama la atención por su gran tamaño. Es el más común de los buitres de Madrid. La gorguera de plumas de su cuello cambia de color con la edad, pasando del pardo de los juveniles al blanco de los adultos.



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie

Especie de córvido endémica de la Península Ibérica. Más pequeño que la urraca y muy ruidoso. Identificable por su capirote negro, el azul de sus alas y cola larga que destaca cuando vuela.



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.



Emberiza cia
Escribano montesino
Rock Bunting

Paseriformes de cuerpo pardo rojizo y cabeza gris, donde contrastan sus líneas faciales negras. Se encuentra generalmente en zonas de matorral de montaña.



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

Águila robusta. Es generalmente más oscura que el águila real lo que contrasta con sus hombros decorados de blanco. Los ejemplares jóvenes son de un color pardo más claro.

Y también...



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Turdus merula
Mirlo común
Common Blackbird



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Hieraetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Monticola solitarius
Roquero solitario
Blue Rock Thrush



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian Golden Oriole



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Tres Cantos

El Mirador de Valdelagánar es un punto elevado que ofrece una visión amplia del paisaje que conecta el Monte de Viñuelas con los espacios abiertos del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El acceso se realiza desde Tres Cantos siguiendo el Cordel de Valdeloshielos, un recorrido de 6 km que atraviesa encinares, pastizales y zonas de transición donde es habitual observar aves de medios abiertos además de rapaces forestales que utilizan las corrientes térmicas para desplazarse por el valle. Desde el mirador y durante los meses de septiembre y octubre es posible escuchar los bramidos y, con suerte, observar las luchas entre machos de los ciervos en época de reproducción o berrea.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 434132 Y: 4494861

Especies destacadas



Curruca melanocephala

Curruca cabecinegra
Sardinian Warbler

Pequeño pájaro de ojos rojos, cuyo macho exhibe un marcado capirote negro. Vive en matorrales mediterráneos y zonas de cultivo. Su alimentación es omnívora, consumiendo principalmente insectos, y complementando con frutos y bayas.



Ciconia nigra
Cigüeña negra
Black Stork

Especie tímida que requiere de combinación de áreas montañosas y arboladas junto a embalses y zonas húmedas tranquilas.



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.



Streptopelia turtur
Tórtola europea
European Turtle Dove

Ave esbelta, con el dorso y los hombros anaranjados y moteados de negro, un collar de listas negras y blancas, la cabeza y el cuello de color gris azulado, y el pecho rosado.



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

Águila robusta. Es generalmente más oscura que el águila real lo que contrasta con sus hombros decorados de blanco. Los ejemplares jóvenes son de un color pardo más claro.

Y también...



Sus scrofa
Jabalí
Wild boar



Cervus elaphus
Ciervo rojo
Red Deer



Circaetus gallicus
Culebrera europea
Short-toed Snake Eagle



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian Golden Oriole



Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico
Iberian Magpie



Jynx torquilla
Torcecuello euroasiático
Eurasian Wryneck



Egretta garzetta
Garceta común
Little Egret



Bubo bubo
Búho real
Eurasian Eagle-Owl



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Tres Cantos

El itinerario de la Vereda de las Tapias de Viñuelas recorre durante 2 km un interesante corredor natural dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares en la zona periurbana de Tres Cantos. El camino avanza entre encinares, pastizales y zonas de matorral donde es habitual observar ungulados silvestres como ciervos, gamos y jabalíes, que utilizan estos espacios abiertos para alimentarse y desplazarse entre las manchas de bosque donde se refugian. Durante los meses de otoño, este recorrido ofrece además la posibilidad de escuchar la berrea, el impresionante bramido de los ciervos machos en época de celo.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 443595 Y: 4496783

Especies destacadas



Cervus elaphus
Ciervo rojo
Red Deer

Ungulado salvaje de mayor tamaño de la Península Ibérica. Se caracteriza por las astas ramificadas de los machos. Al final del verano e inicio del otoño se puede oír la berrea de los machos.

Cérvido de mediano tamaño fácilmente reconocible por su librea negra y blanca en su parte trasera. Los machos tienen las astas en forma de palas con puntas. En primavera su pelaje se cubre de motas blancas.



Dama dama
Gamo europeo
European Fallow Deer



Aquila adalberti
Águila imperial ibérica
Spanish Imperial Eagle

Águila robusta. Es generalmente más oscura que el águila real lo que contrasta con sus hombros decorados de blanco. Los ejemplares jóvenes son de un color pardo más claro.

Buitre de tonos pardos que llama la atención por su gran tamaño. Es el más común de los buitres de Madrid. La gorguera de plumas de su cuello cambia de color con la edad, pasando del pardo de los juveniles al blanco de los adultos.



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture

Es el ave con mayor envergadura de alas de España. Reconocible por su gran tamaño y su cola de morfología apuntada. Los juveniles son de un color negro que pierde intensidad con la edad.

Y también...



Dendrocopos major
Pico picapinos
Great Spotted Woodpecker



Oriolus oriolus
Oropéndola europea
Eurasian Golden Oriole



Otus scops
Autillo europeo
Eurasian Scops Owl



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Accipiter gentilis
Azor común
Northern Goshawk



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Valdemorillo

Charca ubicada en la Cañada Real Segoviana, en un entorno de media montaña entre Valdemorillo y Villanueva de la Cañada, constituye un enclave de gran interés para la conservación de la herpetofauna asociada a la rampa de la sierra de Guadarrama. Este espacio se ha consolidado como refugio para diversas especies de anfibios, ofreciendo a los aficionados a la herpetología la oportunidad de observar, con paciencia y respeto, algunas de las especies más representativas de la fauna madrileña. El acceso se realiza desde Cerro Alarcón.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 411020 Y: 4480687

Especies destacadas



Pelophylax perezi
Rana verde común
Iberian Water Frog

Especie de rana originaria de las regiones ibéricas y francesas. Es un anfibio fácil de observar por su tendencia a asolearse en las orillas. En época estival es común escuchar su canto.

Sapo de mediano tamaño con predominantes tonos verdes. Reconocible por su ojo verdoso de pupila horizontal. Su nombre se debe a su preferencia por dar pequeñas carreras en lugar de emplear saltos para trasladarse.



Epidalea calamita
Sapo corredor
Natterjack Toad



Bufo spinosus
Sapo común ibérico
Spiny Toad

Sapo de gran tamaño, con cuerpo robusto y cabeza ancha. De coloración predominantemente parda, en el que contrastan sus ojos rojizos anaranjados. Es el mayor anfibio de España.



Pleurodeles waltl
Gallipato
Iberian Ribbed Newt

Anfibio de hábitos mayoritariamente acuáticos. Se caracteriza por las protuberancias anaranjadas de sus flancos, ligadas a sus costillas, que puede proyectar como mecanismo de defensa frente a depredadores.

Y también...



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Aegypius monachus
Buitre negro
Cinereous Vulture



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Circaetus gallicus
Águila calzada
Short-toed Snake Eagle



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel




Cyanistes caeruleus
Herrerillo común
Eurasian Blue Tit

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Valdetorres del Jarama

El itinerario de 2 km por la Cañada de la Virgen del Campo sigue el trazado de la vía pecuaria desde Valdetorres del Jarama y conduce hacia el Soto del Manjomar, monte de Utilidad Pública de titularidad municipal estrechamente vinculado a la ribera del Jarama. El recorrido avanza entre cultivos de secano, pastizales y pequeñas manchas de encinar hasta alcanzar el soto fluvial donde tanto la vegetación como la fauna cambian por completo. A lo largo del camino es habitual encontrar fauna de campiña mientras que en el entorno del soto aumenta la presencia de especies ligadas a la ribera.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 455834 Y: 4506195

Aves destacadas



Pterocles orientalis
Ganga ortega
Black-bellied Sandgrouse

Habita en estepas pedregosas, llanuras semiáridas y barbechos. Es más grande y robusta que otras gangas y con un característico vientre negro. Su alimentación es granívora (semillas y brotes).

Especie tímida que requiere de combinación de áreas montañosas y arboladas junto a embalses y zonas húmedas tranquilas.



Ciconia nigra
Cigüeña negra
Black Stork




Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron

Garza crepuscular y nocturna que frecuenta humedales, donde pesca peces y anfibios. Nidifica en árboles. Presente en primavera y verano en muchas zonas húmedas españolas.

Especie gregaria. En primavera, durante el celo, los machos destacan por sus exhibiciones y cantos, contrastando los collares blancos contra el negro de su cuello.



Otis tarda
Sisón común
Little bustard



Otis tarda
Avutarda euroasiática
Great Bustard

Ave inconfundible, de gran tamaño. Habitante característico de las extensas llanuras cerealistas. Las hembras son de menor tamaño y lucen un plumaje algo más apagado.

Y también...



Alectoris rufa
Perdiz roja
Red-legged Partridge



Coturnix coturnix
Codorniz común
Common Quail



Circus cyaneus
Aguilucho pálido
Marsh Harrier



Circus pygargus
Aguilucho cenizo
Montagu's Harrier



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Egretta garzetta
Garceta común
Little Egret



Gyps fulvus
Buitre leonado
Eurasian Griffon Vulture



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron





Coloeus monedula
Grajilla occidental
Western Jackdaw

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Valverde de Alcalá

El Mirador Camino de los Ángeles se sitúa en uno de los puntos elevados que mejor representan el paisaje abierto y ondulado de la Alcarria madrileña. Desde este enclave se domina un amplio mosaico de lomas yesíferas, campos de cultivo, barrancos y manchas de matorral mediterráneo, un entorno ideal para aves de medios abiertos y rapaces que utilizan las corrientes térmicas para desplazarse por el valle. Este mirador forma parte de las actuaciones impulsadas por Aracove, Asociación de Desarrollo Local en la Comarca de las Vegas y la Campiña del Henares "Alcarria de Alcalá".



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 473714 Y: 4473947

Aves destacadas

Y también...



Oenanthe leucura
Collalba negra
Black Wheatear

Pequeña ave terrestre, negra con el obispillo y los laterales de cola de color blanco. Suele verse su silueta posada sobre rocas y cortados.



Monticola solitarius
Roquero solitario
Blue Rock Thrush

Habita en zonas rocosas. El macho es de color azul oscuro y la hembra cuenta con un plumaje más discreto, con jaspeado blanco y una librea gris o gris-parda.



Aquila chrysaetos
Águila real
Golden Eagle

Imponente ave rapaz de gran envergadura y plumaje castaño oscuro con matices dorados en la nuca. Habita zonas montañosas y cantiles del hemisferio norte, donde caza con gran eficacia mamíferos y aves.



Bubo bubo
Búho real
Eurasian Eagle-Owl

Rapaz nocturna más grande de Europa. Posee un plumaje críptico de tonos leonados, pardos y marrones y unos penachos cefálicos característicos. Es un superdepredador muy versátil.



Pyrrhonorax pyrrhonorax
Chova piquirroja
Red-billed Chough

Córido de tamaño mediano de plumaje negro brillante. Posee un característico pico rojo intenso, largo y curvado, y patas de coloración igualmente rojiza. Es gregaria y excelente acróbata.



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Hirundo rustica
Golondrina común
Barn Swallow



Hieraaetus pennatus
Águila calzada
Booted Eagle



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Merops apiaster
Abejaruco europeo
European Bee-eater



Chloris chloris
Verderón común
European Greenfinch



Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar
Common Kestrel



Milvus milvus
Milano real
Red Kite




Pica pica
Urraca común
Eurasian Magpie

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Velilla de San Antonio

Observatorio localizado en uno de los humedales catalogados de Velilla de San Antonio, originado por antiguas actividades mineras y actualmente naturalizado, en contacto directo con el río Jarama. Este enclave dispone de varios senderos que permiten ampliar el recorrido y disfrutar del entorno durante la visita. Especialmente recomendable durante la primavera e invierno para la observación de aves acuáticas. Se puede acceder desde el núcleo urbano de Velilla de San Antonio



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 459022 Y:4466800

Aves destacadas



Aythya fuligula
Porrón moñudo
Tufted Duck

Pato buceador reconocible por el penacho o moño que luce en la nuca. Inverna en Madrid en lagunas de aguas profundas y en embalses. Se alimenta de invertebrados acuáticos y de plantas.



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern

Habita carrizales y vegetación densa. Es un migrador transahariano aumentando su presencia en primavera, siendo esta muy baja en invierno. Muy discreto, suele detectarse por su canto profundo y repetitivo.



Nycticorax nycticorax
Martinete común
Black-crowned Night Heron

Garza crepuscular y nocturna que frecuenta humedales, donde pesca peces y anfibios. Nidifica en árboles. Presente en primavera y verano en muchas zonas húmedas españolas.



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.



Alcedo atthis
Martín pescador común
Common Kingfisher

Llamativo por su color azul turquesa, pico largo que usa para pescar y su metálico y estridente reclamo. Se posa en carrizos o ramas bajas desde donde se lanza en picado a pescar. Habitual de los ríos y humedales madrileños

Y también...



Mareca strepera
Ánade friso
Gadwall



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe



Egretta garzetta
Garceta común
Little Egret



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard



Milvus milvus
Milano real
Red Kite





Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

● Residente ● Estival ● Invernante

Ubicación: Villamanrique de Tajo

La senda fluvial de Villamanrique de Tajo acompaña al río entre sotos de chopos y álamos, creando un recorrido fresco y sombreado. A lo largo del camino es habitual observar aves ligadas al cauce. Al alejarse ligeramente del río Tajo, el paisaje se abre a los cultivos tradicionales de la vega: huertas, regadíos y campos de cereal que forman un mosaico agrícola donde aparecen especies propias de medios agrícolas. Un itinerario sencillo que combina naturaleza, paisaje agrario y observación de fauna y donde, si tienes suerte, podrás descubrir lo que son realmente las gangas.



Coordenadas UTM (ETRS89) X: 479558 Y: 4435126

Aves destacadas



Pterocles orientalis
Ganga ortega
Black-bellied Sandgrouse

Habita en estepas pedregosas, llanuras semiáridas y barbechos. Es más grande y robusta que otras gangas y con un característico vientre negro. Su alimentación es granívora (semillas y brotes).

Fácilmente avistable durante primavera y verano. Especie migratoria que cría en la Península Ibérica durante el periodo estival. En general es de color más oscuro que el milano real y con las plumas de la cola menos ahorquilladas.



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite

Ave de coloración general negruzca, salvo la garganta, que es de tonos blanquecinos. Tiene el cuello largo y grueso y el pico prominente y gris.




Phalacrocorax carbo
Cormorán grande
Great Cormorant

Especie gregaria. En primavera, durante el celo, los machos destacan por sus exhibiciones y cantos, contrastando los collares blancos contra el negro de su cuello.



Sisón común
Little bustard



Otis tarda
Avutarda euroasiática
Great Bustard

Ave inconfundible, de gran tamaño. Habitante característico de las extensas llanuras cerealistas. Las hembras son de menor tamaño y lucen un plumaje algo más apagado.

Y también...



Columba palumbus
Paloma torcaz
Common Wood Pigeon



Streptopelia turtur
Tórtola europea
European Turtle Dove



Coturnix coturnix
Codorniz común
Common Quail



Alectoris rufa
Perdiz roja
Red-legged Partridge



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Common Chiffchaff



Upupa epops
Abubilla
Eurasian Hoopoe



Circaetus gallicus
Culebrera europea
Short-toed Snake Eagle



Bubo bubo
Búho real
Eurasian Eagle-Owl

● Residente ● Estival ● Invernante

