

Boga

Chondrostoma polylepis (S. 1864)

Fam CYPRINIDAE



rínidos



• Descripción:

- Cuerpo: Fusiforme (huso), alargado.
Línea media 68-70 escamas pequeñas. Línea negra dorsal delgada.
Boca pequeña característica en posición ínfera. Sin barbillones.
Labio inferior con lámina córnea recta y afilada. Sensación de morro hoci-cudo. Ojos relativamente grandes.
- Aletas: 1 dorsal a la altura de la ventral de 8-10 radios, anal 8-12 radios.
Corta, hendida y puntiaguda.
- Tamaño pequeño-medio 12-16 cm y 50 gm hasta 28 cm.
- Color: Plateado-azul oscuro en el dorso y flancos más claros. A veces con punteaduras finas en dorso y flancos.
- Viven hasta 8 años los machos y 10 las hembras.

• Habitat:

- Tramo MEDIO-bajo (más alto para la freza). Preferiblemente ríos con cierta profundidad pero también en embalses.
- Comportamiento muy gregario en aguas libres de contaminación, bien oxigenadas y algo rápidas, pero no corrientes fuertes ni muy frías.

• Reproducción:

- Freza en depresión del lecho de arena y grava en primavera (en aguas más frías hasta mayo-junio). Maduran a los 3-4 años.

• Alimentación:

- Algas y vegetales e invertebrados: Lombrices, larvas, insectos.

• Distribución geográfica:

- Endemismo ibérico, presente en la cuenca del Duero. Introducida en Júcar y Segura. En clara regresión.
- En Madrid se encuentra en las cuencas de Lozoya, Alberche, Jarama y Perales.
También citada en poblaciones menores en Manzanares, Henares, Tajo y Guadarrama.



- **Pesca:**

- Cupo máximo hasta 30 ejemplares mayores de 15 cm.
- A pesar de su dimensión y de la carencia de valor de su carne es una especie con alto interés deportivo. Por el tamaño de su boca, con anzuelos pequeños.

- **Protección:**

- Anejo III C. Berna 82/72 y Anejo II Directiva habitat 1992.
- Citada como "objeto de pesca" Real Decreto 1095/89 y "comercializable" Decreto 1118/89.



Diferencias:

- Escamas pequeñas.
 - Boca ínfera y labio inferior córneo (boga).
 - Línea recta algo curvada (pardilla).
- Escamas grandes.
 - Aleta dorsal atrasada.
 - * Aleta anal 7 radios (calandino).
 - * Aleta anal 17 radios (alburno).
 - Aleta adelantada y axilas rojizas (bermejuela).
 - Aleta anal redondeada y boca hacia arriba.
 - Escamas con borde oscuro (cacho).

