Cachuelo, cacho, escalo

Leuciscus pyrenaicus
(Squalius pyrenaicus, Günther 1868)

Fam CYPRINIDAE

Aut. Cip rínidos

- **Descripción:**
  - — Cuerpo: Fusiforme alargado bastante redondo o circular.
    Línea dorsal 30-50 escamas grandes con borde u orla oscura.
    Cabeza relativamente grande y ancha.
    Boca grande y anterior sin barbillones. Morro levantado.
  - — Color grisáceo oscuro con reflejos verdosos. Costados amarillentos.
  - — Aletas: Dorsal insertada a la altura de la ventral, con 3 radios unidos y 10 divididos. Pélvica y anal de tonalidades rosáceas (7-9 radios), ésta horcada y curvada.
    Alcanza normalmente 8-15 cm (excepcionalmente 25 cm y 200 gr).
- **Habitat:**
  - — Tramo medio-bajo y rápido en lugares con mucha vegetación y orillas.
  - — Aguas puras con o sin corriente (preferiblemente sí).
  - — Sensible a la contaminación y bastante adaptable a altas temperaturas.
  - — Puede vivir en embalses y aguas quietas. Desciende en altitud con la edad.
  - — Comportamiento gregario.
- **Reproducción:**
  - — Madurez a los 3-4 años.
  - — Freza desde mediados de marzo hasta junio en aguas más lénticas.
  - — Deposita de 50.000 a 200.000 huevos/hembra, sobre depresiones del lecho.
- **Alimentación:**
  - — Macroinvertebrados (larvas y lombrices), materia vegetal y de adultos, alevines de peces y renacuajos.
- **Distribución geográfica:**
  - — Endemismo ibérico. Por toda la mitad sur de España y Portugal.
  - — Cuencas de Lozoya, Manzanares, Jarama y Guadalix y Alberche.
- **Pesca:**
  - — En primavera busca corriente y en invierno escasa actividad entre la vegetación y los fondos.
  - — Cupo máximo de 30 ejemplares y dimensión mínima de 12 cm.
  - — Muy desconfiado. Con flotadores delgados y transparentes.
  - — Lombriz de tierra, cucharillas pequeñas, moscas, etc.
- **Protección:**
  - — Endémico de P. Ibérica. Anejo III Berna 82/72.