

Servicio de Radiodiagnóstico

Información para pacientes

Recomendaciones generales para preparación de pacientes para
RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA

PREPARACION GENERAL DEL PACIENTE

- **AYUNAS DE AL MENOS 6 HORAS**, tanto de alimentos sólidos como líquidos. En caso de ser diabético notifíquelo al personal a su llegada.
- **ANALITICA** que incluya tiempos de coagulación de menos de 3 meses de antigüedad. En caso de antecedentes de enfermedad hepática, oncológica o hematológica póngase en contacto con su médico por si fuese preciso solicitar una analítica más reciente con tiempos de coagulación.
- **CONSENTIMIENTO INFORMADO:** Léalo detenidamente con anterioridad a la fecha de la prueba. Si tiene alguna duda acuda sin cita de lunes a viernes en horario de mañana a la sección de Radiología Vascular-Intervencionista (Planta Baja Norte) para consultar con un Radiólogo Vascular-Intervencionista. No se olvide de traerlo firmado el mismo día de la prueba.
- **ES NECESARIO QUE ACUDA A LA INTERVENCIÓN ACOMPAÑADO.**

LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN REFERENTE A SU MEDICACIÓN

- **Antiagregantes:** Si usted toma ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg (Ej. Adiro® 100, Bartal® 100), no es necesario que lo suspenda.
- Si usted toma cualquier otro antiagregante debe comunicarlo y ponerse en contacto con su médico quién valorará la posibilidad de suspenderlo una semana antes o disminuir la dosis a Adiro® 100 mg, cinco días antes del procedimiento.
- **Anticoagulantes:** Si usted toma tratamiento anticoagulante con SINTROM® deberá comunicarlo y ponerse en contacto con su médico para realizar pauta de sustitución con heparina subcutánea los 2-3 días previos al procedimiento. Tenga en cuenta que DEBEN transcurrir al menos 24 horas desde la última dosis de heparina y la realización del procedimiento.
- Si usted toma tratamiento con anticoagulantes de acción directa como XARELTO® (RIVAROXABAN), PRADAXA® (DABIGATRAN), ELIQUIS® (APIXABAN), etc. tenga en cuenta que deben transcurrir al menos 24 horas desde la última dosis del medicamento y la realización del procedimiento. Usted debe ponerse en contacto con su médico para que le indique con exactitud la pauta conveniente para su caso en particular.
- Salvo en los casos anteriores, puede seguir tomando el resto de su medicación habitual. **ES IMPORTANTE QUE NO SUSPENDA LA MEDICACIÓN PARA LA TENSION ARTERIAL** (Antihipertensivos): Puede tomarla con medio vaso de agua.

Ante cualquier duda que pueda tener con la medicación puede consultarla con su médico o directamente con cualquiera de los médicos de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista.