



Servicio Medicina Nuclear
Puerta "G" Planta Sótano Ala Norte

GAMMAGRAFÍA DE RECEPTORES DE SOMATOSTATINA

- PREPARACIÓN:** No es necesario acudir en ayunas
- EXPLORACIÓN:** Consiste en la realización de un estudio para valorar posible tratamiento con somatostatina.
- TÉCNICA:** Se inyecta un radiofármaco en el antebrazo por vía intravenosa. Se obtienen imágenes en dos tiempos, unas a las dos horas de la inyección y las segundas a las cuatro horas de la inyección del fármaco.
Durante este tiempo **permanecerá en la Sala de Pacientes Inyectados.**
- MEDICAMENTOS:** Puede tomar su tratamiento habitual..
- EFFECTOS SECUNDARIOS:** No produce dolor ni reacción alérgica.
La radiación es similar a la de un estudio radiológico. Aconsejamos beber abundante líquido después de la prueba y orinar frecuentemente.
- PRECAUCIONES:** **Las mujeres en período de lactancia deberán advertirlo antes de que les sea administrado el radiofármaco.**
El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.
Desde el día de la inyección hasta 24 horas después debe evitar el contacto con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.
- CONTRAINDICACIONES:** Embarazo (salvo casos excepcionales). Si hay posibilidad de que pudiera estar embarazada, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear.

SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE AL MÉDICO O A LA ENFERMERA