



Servicio Medicina Nuclear
Puerta "G" Planta Sótano Ala Norte

GAMMAGRAFÍA TIROIDEA

- PREPARACIÓN:** No es necesario acudir en ayunas.
- EXPLORACIÓN:** Consiste en la realización de un estudio de morfología-función tiroidea.
- TÉCNICA:** Se inyecta un radiofármaco en el antebrazo por vía intravenosa. Tiene que esperar de 10 minutos a 1 hora a partir de la inyección del fármaco.
La duración de la prueba en la gammacámara es de unos 15 minutos aproximadamente.
- MEDICAMENTOS:** Es preciso saber si toma alguno para el tiroides. En algunas ocasiones están contraindicados con la realización de la prueba.
- EFFECTOS SECUNDARIOS:** No produce dolor ni reacción alérgica. La radiación para el paciente es similar a la de un estudio radiológico.
Aconsejamos beber abundante líquido: 1-2 litros aproximadamente y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba para su posterior eliminación.
- PRECAUCIONES:** **Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El especialista les indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo. Durante las 24h posteriores a la inyección evitará el contacto con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.**
- CONTRAINDICACIONES:** Embarazo (salvo casos excepcionales). Si cree que puede estar embarazada, deberá advertirlo antes de la inyección.

SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE AL MÉDICO O A LA ENFERMERA