



Servicio de Neumología  
UNIDAD DE ENDOSCOPIA  
Puerta "G" Planta Baja Ala Norte

## BRONCOSCOPIA

### DIETA

Acudir en **AYUNAS** desde 8 horas antes de la exploración: NO tomar sólidos ni líquidos (tampoco agua). Evitar tomar caramelos y chicles.

### MEDICACIÓN

- **Antiagregantes:** Aspirina<sup>®</sup>, Adiro<sup>®</sup> 300mg. - 500mg. , Plavix<sup>®</sup>, Disgren<sup>®</sup>...:  
Suspender 7 días antes de la realización de la pruebas.  
(NO es necesario suspender Adiro<sup>®</sup> 100 mg.)
- **Anticoagulante:** Sintrom<sup>®</sup>, Heparina, Xarelto<sup>®</sup> y otros anticoagulantes orales  
Debe ser valorado previamente por el servicio de Hematología o por su médico habitual.  
Tras suspender el tratamiento anticoagulante es necesario realizar un control de coagulación (INR) en las horas previas a la prueba.
- **Antidiabéticos orales e Insulina**  
NO tomar el antidiabético oral ni pincharse la insulina el día de la cita hasta después de la prueba.
- **Broncodilatadores**  
NO Suspender

**COMUNIQUE A LOS PROFESIONALES QUE LE VAN A HACER  
LA PRUEBA CUALQUIER CAMBIO DE SU MEDICACIÓN.**

### DOCUMENTACION Y PRUEBAS

- Si dispone de informes, PET, radiografías o TAC torácicos realizados en otro centro, debe aportarlos.
- NO OLVIDE traer el consentimiento informado firmado por el médico que solicita la prueba y por el paciente o representante legal
- Es imprescindible tener unos tiempos de coagulación y un hemograma con plaquetas recientes (15-20 días).

**Nota:** El paciente deberá venir acompañado La hora de citación es orientativa. Cada paciente requiere para su correcta atención un tiempo de exploración que no se puede fijar previamente.

Ante cualquier duda contactar con el Servicio de Neumología. Tfno. (91/3303477)