

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Los primeros días posteriores a la instilación pueden aparecer algunos de estos **efectos secundarios**:

- Orinar con más frecuencia y/o con dolor y escozor.
- Orina de color rosado.
- Síntomas parecidos a una gripe (fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular).

CONSULTE A SU URÓLOGO/A si las molestias persisten o le surge alguna duda.

CONSULTA Tumor Vesical
3ª NORTE – SALA 3002
Tel.: 91-330 37 59

CONSULTA Enfermería
Planta BAJA SUR – SALA B030
Tel.: 91-330 37 60

HORARIO : 8 a 13 horas de Lunes a Viernes

ACUDIR A URGENCIAS SI :

- Pícor, descamación y/o erupciones cutáneas.
- Molestias intensas más de 2 días.
- Presenta fiebre alta (más de 38°C)
- Aparición de sangre en la orina con coágulos.



Hospital Clínico San Carlos
C/Prof. Martín Lagos, s/n
28040 Madrid

www.madrid.org/hospitalclnicosancarlos

Versión 1
Mayo 2021
Aprobado por el CTCIL

Información para
pacientes y familiares

Instilación vesical

Documento Informativo
Hospital Clínico San Carlos
Servicio de Urología

 **Hospital Clínico
San Carlos**

Instilación vesical

¿Que es la instilación vesical ?

La instilación vesical es un procedimiento mediante el cual se administra medicación en la vejiga a través de una sonda de pequeño calibre que se retirará inmediatamente después.

¿Para que se administran estos fármacos?

Tras la realización de una resección transuretral (RTU) del tumor y para evitar que reaparezca la enfermedad, su médico le ha prescrito un tratamiento endovesical o “lavado vesical” introduciendo un medicamento en el interior de la vejiga.

El tratamiento se lleva a cabo en las consultas del Servicio de Urología (planta Baja Sur – Sala B030)




Recomendaciones

... antes de la instilación

Disminuya al máximo el consumo de líquidos.

... después de la instilación

- Retener la medicación durante 2 horas.
- No beba en exceso durante esas 2 horas.
- Debe tumbarse y **cambiar de postura** cada 15 minutos, para que la medicación se distribuya bien por toda la vejiga.



PASADAS LAS DOS HORAS ...

- **BEBER ABUNDANTE** líquido para orinar frecuentemente. De esta manera se elimina lo antes posible el medicamento.
- Durante las **6 horas** siguientes deberá orinar **en el baño sentado** para evitar salpicaduras. Seguidamente verterá un chorro de lejía tras cada micción.
- Lavarse las manos y los genitales después de orinar.
- Es conveniente **no tener relaciones sexuales las primeras 48 horas**. Se aconseja utilizar preservativo durante el tratamiento.