

CISTERNOGAMMAGRAFÍA

Se trata de un estudio que permite valorar fugas de líquido cefalorraquídeo (LCR).

PREPARACIÓN

- Antes de realizar la prueba se le colocarán tapones de algodón en fosas nasales y conductos auditivos.

TÉCNICA

- Se inyecta un radiofármaco mediante punción lumbar.
- Deberá mantenerse en decúbito supino hasta 1 hora después de la inyección.
- Se adquirirán imágenes de la cabeza a las 3, 24 y 48 horas de la inyección (en algunos casos no serán necesarias las 3 imágenes).

EFFECTOS SECUNDARIOS

- En ocasiones tras la punción puede haber cefalea o fuga de LCR. Para evitarlo es importante mantenerse en decúbito supino una hora después de la punción.
- Aconsejamos **beber abundante líquido** y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.


PRECAUCIONES

- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. Nosotros le indicaremos si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.
- Durante las 24 horas posteriores a la inyección, evitará el contacto con embarazadas y niños menores de 13 años.

CONTRAINDICACIONES

Si está **EMBARAZADA** o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Si tiene alguna duda pregunte al Médico o a la Enfermera de "Preparación de Pruebas".

 **91/330 30 00 (ext. 7505)** Horario: lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas