



Servicio de Medicina Nuclear
Puerta "G" Sótano Norte

DETECCIÓN DE GANGLIO CENTINELA EN MELANOMA

La biopsia selectiva del ganglio centinela es el procedimiento de elección para localizar los ganglios que deben ser extirpados en la cirugía de melanoma.

PREPARACIÓN

- No se requiere ningún tipo de preparación especial para la prueba.
- Si lo desea puede venir con un acompañante.

TÉCNICA

- Se inyecta un radiofármaco por vía intradérmica alrededor del tumor primario.
- Inmediatamente después de la inyección se realizarán imágenes para tratar de localizar el/los ganglio/s centinela.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Podrá notar ligera molestia en los puntos de inyección.
- **Beber abundante líquido** y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

PRECAUCIONES

- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección.
- El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.
- Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto con embarazadas y niños menores de 13 años.

CONTRAINDICACIONES

Si está **EMBARAZADA** o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE A SU MÉDICO DE MEDICINA NUCLEAR