



# DETECCIÓN DE MUCOSA GÁSTRICA ECTÓPICA O HEMORRAGIA DIGESTIVA

Consiste en la realización de un estudio para detectar mucosa gástrica ectópica o hemorragia digestiva.

## PREPARACIÓN

- Deberá acudir en **AYUNAS**

## TÉCNICA

- Se le inyectará un radiofármaco por vía intravenosa. Tras la inyección deberá esperar entre 10 y 20 minutos antes de la adquisición de imágenes.
- La duración de la prueba es de aproximadamente 2 horas.
- En algunos casos hay que hacer imágenes adicionales a las 24 horas.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

- No produce dolor ni reacción alérgica.
- La radiación para el paciente es similar a la de un estudio radiológico.

## PRECAUCIONES

- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la prueba. El especialista les indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.
- Durante las 24 horas posteriores a la inyección evitará el contacto con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.

## CONTRAINDICACIONES

Si está **EMBARAZADA** o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección

**Si tiene alguna duda pregunte al Médico o a la Enfermera de "Preparación de Pruebas".**

 **91/330 30 00 (ext. 7505)** Horario: lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas