

Servicio de Medicina Nuclear
Puerta "G" Sótano Norte

ESTUDIO DE VACIAMIENTO GÁSTRICO

Consiste en la realización de un estudio para valorar alteraciones en el vaciamiento gástrico.

PREPARACIÓN

- Deberá acudir en ayunas de al menos 8 horas
- Evitará el alcohol, cafeína, chocolate y tabaco desde la noche anterior
- Retirá la medicación, que puede interferir, 1 día antes :
 - * Cardiovascular: Dopamina, L-DOPA, nifedipina, potasio
 - * Respiratorio: beta-adrenérgicos
 - * Gastrointestinal: procinéticos, antieméticos, opiáceos, laxantes, sucralfato
 - * Psiquiatría: sedantes y antidepresivos
 - * Hormonas: estrógenos, progesterona, calcitonina
 - * Antibióticos: eritromicina

TÉCNICA

- Se le dará por vía oral un radiofármaco mezclado con un líquido/semisólido, terminando la toma con líquido/semisólido no marcado.
- Se realizarán a continuación imágenes para evaluar el vaciamiento gástrico durante aproximadamente 2 horas y media.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No produce dolor ni reacciones alérgicas.


PRECAUCIONES

- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la prueba. El especialista les indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.
- Durante las 24 horas posteriores a la inyección evitará el contacto con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.

CONTRAINDICACIONES

Si está **EMBARAZADA** o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear antes de la administración del medicamento.

Si tiene alguna duda pregunte al Médico o a la Enfermera de "Preparación de Pruebas"

 **91/330 30 00 (ext. 7505)** Horario: lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas