



GANGLIO CENTINELA OTROS TUMORES

La biopsia selectiva del ganglio centinela es el procedimiento de elección para localizar los ganglios que deben ser extirpados en la cirugía de su tumor.

PREPARACIÓN

- No se requiere ningún tipo de preparación especial para la prueba.

TÉCNICA

- Se inyecta un radiofármaco generalmente en cuatro puntos de inyección alrededor del tumor primario (podrá variar la técnica de inyección dependiendo de cada caso).
- Deberá esperar entre 30 minutos y dos horas para la adquisición de las imágenes gammagráficas para tratar de localizar el/los ganglio/s centinela.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Podrá notar ligera molestia en los puntos de inyección.
- **Beber abundante líquido** y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

PRECAUCIONES

- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.
- Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto con embarazadas y niños menores de 13 años.

CONTRAINDICACIONES

Si hay posibilidad de que pudiera estar embarazada, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE A SU MÉDICO DE MEDICINA NUCLEAR