



GAMMAGRAFÍA SUPRARRENAL CON ¹³¹I-YODOCOLESTEROL

Consiste en la realización de un estudio suprarrenal para valorar posibles patologías. Hay dos formas de exploración, y será su médico quién le indique cuál de las dos exploraciones le va a solicitar de cara a la preparación de prueba que será diferente:

- **SIN supresión de la producción de glucocorticoides.**
- **CON supresión de la producción de glucocorticoides.**

PREPARACIÓN (para ambas pruebas CON Y SIN SUPRESIÓN):

- **BLOQUE DEL TIROIDES**

Tomará Yoduro potásico 130 mgr. cápsula con agua cada 24h, desde tres días antes de la prueba hasta dos días después de finalizar.

- **SI TIENE ALERGIA AL YODO**

Cambiar yoduro potásico por PERCLORATO SÓDICO 400mgr. (1,3ml).

- **SÓLO EN LA PRUEBA CON SUPRESIÓN DE GLUCOCORTICOIDES**

Se administrará **Dexametasona 2 mg/12 horas**, comenzando 7 días antes de la administración del radiofármaco y continuando hasta el tercer día post-inyección

**RECOGER LA MEDICACIÓN EN "PREPARACIÓN DE PRUEBAS"
(Puerta "I", planta Baja ala Sur).**

Seguirá las pautas de tratamiento prescritas por su médico Endocrino antes de la prueba.

TÉCNICA

- Se inyecta un radiofármaco en el antebrazo por vía intravenosa.
- Se realizan imágenes a las 24, 48 y 72 horas, 4º día y 7º día después de la inyección.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- No produce dolor.
- Si tiene alergias conocidas al Yodo, consulte con su médico.


PRECAUCIONES

- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. Nosotros le indicaremos si deben interrumpirla y por cuánto tiempo.
- Durante 8 días posteriores a la inyección, evitará el contacto con embarazadas y niños menores de 13 años.

CONTRAINDICACIONES

Si está **EMBARAZADA** o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear, antes de la inyección.

Si tiene alguna duda pregunte al Médico o a la Enfermera de "Preparación de Pruebas".

 **91/330 30 00 (ext. 7505)** Horario: lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas