



TRATAMIENTO DE SINOVITIS CON ⁹⁰Y

Se trata de un procedimiento para el tratamiento de patología inflamatoria dolorosa de la sinovial.

PREPARACIÓN

- No se requiere ninguna preparación específica, únicamente deberá distanciar este tratamiento de otras manipulaciones previas de la articulación (al menos 2 semanas desde la biopsia articular y 2-6 semanas tras artroscopia/cirugía previa).

TÉCNICA

- Se administrará un radiofármaco por vía intra-articular

PRECAUCIONES

Después de la prueba ...

- Deberá mantener inmovilizada la articulación tratada durante 48 horas. El efecto del tratamiento suele notarse a las 2-4 semanas.
- Puede aparecer temporalmente aumento local de la inflamación que suele ceder con la toma de AINEs y aplicación de frío local. Son más raras, aunque de mayor gravedad, la infección de la articulación y la radionecrosis.
- Se aconseja evitar el embarazo durante 4 meses después del tratamiento.
- Deberá evitar la proximidad en las próximas 24 horas con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.

CONTRAINDICACIONES

- Infección local de la piel
- Rotura de quiste poplíteo (en rodilla)
- Si cree que puede estar embarazada, deberá advertirlo antes de la inyección.
- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.

SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE A SU MÉDICO DE MEDICINA NUCLEAR