



## BRONCOSCOPIA

### DIETA

Acudir en **AYUNAS** desde 8 horas antes de la exploración  
**NO** tomar sólidos ni líquidos (tampoco agua). Evitar caramelos y chicles.

### MEDICACIÓN


- **Antiagregantes:** Aspirina<sup>®</sup>, Adiro<sup>®</sup> 300 mg. -500 mg., Plavix<sup>®</sup>, Disgren<sup>®</sup> ...:  
Suspender 7 días antes de la realización de las pruebas.  
(NO es necesario suspender Adiro<sup>®</sup> 100 mg.).
- **Anticoagulante:** Sintrom<sup>®</sup>, Heparina, Xarelto<sup>®</sup> y otros anticoagulantes orales. Debe ser valorado previamente por el servicio de Hematología o por su médico habitual.  
Tras suspender el tratamiento anticoagulante es necesario realizar un control de coagulación (INR) en las horas previas a la prueba.
- **Antidiabéticos orales e insulina**  
NO tomar el antidiabético oral ni pincharse la insulina el día de la cita hasta después de la prueba.
- **Broncodilatadores**  
No suspender.

**COMUNIQUE A LOS PROFESIONALES QUE LE VAN A HACER LA PRUEBA  
CUALQUIER CAMBIO DE SU MEDICACIÓN**

### DOCUMENTACION Y PRUEBAS.

- Si dispones de informes, PET, radiografías o TAC torácicos realizados en otro centro, debe aportarlos.
- NO OLVIDE traer el consentimiento informado firmado por el médico que solicita la prueba y por el paciente o representante legal.
- Es imprescindible tener unos tiempos de coagulación y un hemograma con plaquetas recientes ( 15-20 días).

### RECUERDE ....

- **El paciente debe venir acompañado .**
- La hora de citación es orientativa, cada paciente requiere para su correcta atención un tiempo de exploración que no se puede fijar previamente.
- Ante cualquier duda contactar con el Servicio de Neumología  
 (91-3303477) (Horario de 8 a 15 horas, de Lunes a Viernes).