

Servicio de Aparato Digestivo - UNIDAD DE ENDOSCOPIA

Puerta "G" Planta Baja Ala Norte

COLONOSCOPIA Diagnóstica y/o Terapéutica

Indicaciones para la preparación y realización de la prueba

Estas indicaciones son únicamente aplicables a pacientes adultos (mayores de 14 años). Siga cuidadosamente las indicaciones que figuran a continuación para que la prueba se pueda realizar. Su objetivo es conseguir que el intestino esté completamente limpio en el momento de la prueba para permitir una visión clara del mismo.

En los **días previos** a la prueba tenga en cuenta lo siguiente:

MEDICACIÓN HABITUAL: además de las recomendaciones que le damos, consulte con su médico.

ANTICOAGULANTES ORALES

(Sintrom[®], Eliquis[®], Pradaxa[®] o Xarelto[®]...) acuda al lugar habitual en el que le realizan los controles para que le cambien la medicación. Siga sus recomendaciones. En caso de que su médico le prescriba heparina subcutánea debe administrársela **24 horas antes** de la prueba.

ANTIAGREGANTES

(Tiklid[®], Iscover[®], Plavix[®], Bioplack[®], Adiro[®], Aspirina[®], Ácido Acetilsalicílico[®], Tromalyt[®]): Cuando sepa la fecha de la prueba, consulte con su médico, él le indicará cómo debe actuar, porque en ocasiones no es conveniente dejar de tomarlos. La dosis máxima permitida de Adiro[®] son 100 mg.

Si es DIABÉTICO en tratamiento con insulina o antidiabéticos orales, consulte con su médico, que le informará sobre la pauta a seguir.

Si toma medicación que contenga **Hierro**, **deje de tomarla** 7 días antes

Si utiliza **DIURÉTICOS** o **IECA** (Enalapril, Lisinopril, Captopril...) **NO** los tome desde que comience a tomar la medicación para la limpieza del intestino. *Consulte a su médico o farmacéutico.*

Si su médico considera que va a precisar premedicación antibiótica (por ejemplo si esportador de prótesis valvular) para realizar la exploración deberá aportar el informe correspondiente.

Si es portador de marcapasos o desfibrilador, consulte con su cardiólogo por si fuera necesario efectuar algún cambio en el mismo

EL DIA DE LA EXPLORACION TOMARÁ SU MEDICACION HABITUAL salvo que su médico le indiquelo contrario.

COLONOSCOPIA Diagnóstica y/o Terapéutica

...Qué debo comer los días (_____, _____, _____)

4º, 3º y 2º día ANTES DE LA PRUEBA

Tomar DIETA pobre en residuos

Leche y yogur natural desnatados, quesos frescos, pan blanco o tostado y galletas no integrales, caldos sin verduras, pastas no integrales, carnes y pescados blancos a la plancha o hervidos, huevo en tortilla o cocido, patata en puré o cocidas sin la piel, fruta en compota o almíbar, café, té o infusiones ligeras.



NO DEBE TOMAR

Productos integrales, leche y derivados enteros, fruta y verduras, legumbres, carnes grasas y embutidos, pescados azules, huevos fritos o en salsa, chocolate, pasteles y frutos secos.

BEBA ABUNDANTES LÍQUIDOS (AL MENOS 2 LITROS DE AGUA AL DIA)



1 día ANTES DE LA PRUEBA

día (_____)

Tomar DIETA pobre en residuos en el DESAYUNO

Leche y yogur natural desnatados, quesos frescos, pan blanco o tostado y galletas no integrales, caldos sin verduras, pastas no integrales, carnes y pescados blancos a la plancha o hervidos, huevo en tortilla o cocido, patata en puré o cocidas sin la piel, fruta en compota o almíbar, café, té o infusiones ligeras.



... A PARTIR DEL DESAYUNO

SOLO DEBE TOMAR

LIQUIDOS CLAROS PERMITIDOS: agua, caldos filtrados, zumos colados (manzana, piña), infusiones, bebidas sin burbujas y bebidas isotónicas líquidos (pueden ser azucarados si lo desea).










NO TOMARÁ LECHE.

..... A continuación, siga las instrucciones de la LIMPIEZA INTESTINAL



LIMPIEZA INTESTINAL

CÓMO TOMAR EL PREPARADO PLEINVUE®

<p>Dosis 1 1 Sobre</p>	 <p>Extraer de la bolsa el sobre grande DOSIS 1 de PLEINVUE®.</p>	 <p>Añadir el contenido del sobre en una jarra con MEDIO LITRO de AGUA y remover 8 minutos hasta su disolución, el líquido puede aparecer turbio. Viértalo en vasos</p>	
	<p> a las 8:00 horas <input type="checkbox"/> MAÑANA <input type="checkbox"/> TARDE día:(-----)</p> <p>Una vez preparado el medio litro de PLEINVUE®, viértalo en un vaso y beber lentamente a pequeños sorbos, para una mejor tolerancia. </p> <p>El proceso le llevará 1 hora. Evite beberlo rápidamente.</p> <p>A continuación, beba a demanda, lo que le apetezca, líquidos claros: agua, caldos (colados y sin grasa), zumos colados (manzana, piña), infusiones, bebidas sin burbujas y bebidas isotónicas (pueden ser azucarados si lo desea).</p> <p>NO TOMARÁ LECHE . SOLO se puede tomar líquidos claros permitidos.</p>		
<p> COLONOSCOPIA 5 horas antes de la cita</p>		<p> COLONOSCOPIA + GASTROSCOPIA 6 horas antes de la cita</p>	
<p>día (-----) hora:</p>		<p>día (-----) hora:</p>	
<p>Dosis 2 2 Sobres (A+B)</p>	 <p>Añadir el contenido de los sobres A+B en una jarra con MEDIO LITRO de AGUA REFRIGERADA</p>  <p>Remover durante 8 minutos hasta su disolución, el líquido puede aparecer turbio. Viértalo en vasos</p>		
	<p>Una vez preparado el medio litro de PLEINVUE®, prepare medio litro de zumo de piña refrigerado y viértalo en vasos. </p> <p>A continuación, beber lentamente a pequeños sorbos, alternando los vasos con la solución y el zumo piña, para una mejor tolerancia.</p> <p>El proceso le llevará 1 hora. Evite beberlo rápidamente.</p> <p>A continuación, beba al menos otro medio litro de lo que le apetezca de líquidos claros: agua, caldos filtrados, zumos colados (manzana, piña), infusiones, bebidas sin burbujas y bebidas isotónicas líquidos (pueden ser azucarados si lo desea).</p> <p>NO TOMARÁ LECHE . SOLO se puede tomar líquidos claros permitidos.</p>		

EL DIA DE LA PRUEBA



COLONOSCOPIA

3 horas antes de la cita



COLONOSCOPIA

+ GASTROSCOPIA

4 horas antes de la cita

DIETA ABSOLUTA (no deberá tomar ni sólidos ni líquidos (ni agua).



AYUNAS a partir de las.....horas

EL PACIENTE DEBERÁ VENIR **SIEMPRE ACOMPAÑADO**

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La duración de la prueba depende de los hallazgos que se vayan produciendo, en líneas generales, el recorrido del endoscopio por el tubo digestivo no suele durar más de 60 minutos.

CÓMO ACTUAR DESPUÉS DE LA PRUEBA

- La prueba se realiza habitualmente con sedación, por este motivo el médico que ha realizado la exploración le indicará durante cuánto tiempo no debe conducir ni manejar maquinaria peligrosa.
- Si por cualquier motivo no ha precisado sedación, no necesita ningún cuidado posterior. Salvo que le indiquen algo diferente, puede realizar vida normal.
- Puede seguir su dieta habitual, salvo que se le indique lo contrario.
- Es conveniente que beba líquido, al menos 1 litro de agua durante el resto del día.
- Durante los 2 ó 3 días siguientes a la prueba, puede tener sensación de hinchazón abdominal.
- Si tuviera síntomas (dolor abdominal, sangrado, fiebre) debe acudir al centro en el que le han realizado la prueba para que valoren posibles complicaciones.
- Acuda al servicio de urgencias si nota dolor abdominal intenso, sangrado importante o fiebre.
- Puede tardar unos días en hacer deposición. No tome laxantes.



Sugerencias de Menús

...para los días 4º, 3º y 2º día antes de la prueba



Menú

DESAYUNO

Café con leche desnatada
Tostada de pan blanco con aceite
Zumo natural sin pulpa

COMIDA

Patata cocida con queso fresco y
jamón cocido.
Pescado blanco (merluza, gallo,
lenguado...) a la plancha
Manzana asada sin piel

MERIENDA

Infusión o café con lechedesnatada

CENA

Filete de pollo a la plancha
Queso fresco
Yogur natural desnatado

Menú

DESAYUNO

Café con leche desnatada
Galletas sin fibra
Zumo de frutas sin pulpa

COMIDA

Caldo de verdura filtrado con fideos
Pollo asado o a la plancha sin piel
Compota de Manzana
ó yogur desnatado

MERIENDA

Infusión con leche desnatada
Loncha de jamón cocido con pan

CENA

Tortilla a la francesa
Queso fresco
Yogur desnatado

Menú

DESAYUNO

Café con leche desnatada
Tostada de pan blanco con aceite

COMIDA

Patatas al horno
Pescado blanco al horno
Melocotón en almíbar

MERIENDA

Infusión con leche desnatada

CENA

Caldo de carne filtrado
Filete de pollo
Yogur desnatado