



CISTOSCOPIA

Consiste en la introducción a través de la uretra de una sonda con una pequeña óptica que nos permite ver el interior de la vejiga y la uretra. En ocasiones puede ser más dificultosa y precisar manipulación adicional

Puede ir asociada a la aplicación fármacos intravesicales.

Se realiza con anestesia local tópica (un gel que se introduce en la uretra antes de la realización de la prueba)

Comuníquese a su médico TODO el tratamiento que toma de forma habitual o si presenta alguna alergia o intolerancia farmacológica.

PREPARACIÓN

- Debe acudir **ACOMPAÑADO**
- No precisa ayunas pero le recomendamos **no realizar comidas copiosas** inmediatamente antes de la prueba. Puede hacer un desayuno o comida ligera en las horas previas.
- El médico que realiza el procedimiento le indicará la necesidad de tomar o no antibiótico tras la realización de la misma.
- No precisa suspender su tratamiento habitual salvo que se lo haya recomendado específicamente el médico en la consulta.
- Si es usted paciente con tratamiento anticoagulante no hay que suspenderlo
- Debe aportar el **Consentimiento Informado Firmado**.
- **Acuda con calzado y ropa cómoda y con facilidad para vestirse y desvestirse.**

TRAS LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Es un procedimiento invasivo por lo que no está exento de complicaciones o eventualidades.

- En los dos-tres días siguientes a la realización de la prueba es habitual tener molestias al orinar, pequeños sangrados en la orina, escozor y aumento de la frecuencia miccional.

Debe acudir a **URGENCIAS** en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Fiebre >38.5º C. Sólo precisa control de la temperatura si presenta malestar.
- Sangrado importante con abundantes coágulos.
- Imposibilidad para orinar.

Es IMPORTANTE seguir las indicaciones recomendadas por su seguridad, en caso contrario, se puede suspender la realización de la prueba.

Para cualquier consulta puede llamar ☎ 91 704 38 71