

Servicio Aparato Digestivo

Etiqueta paciente

MANOMETRIA - PHMETRIA

NHC	Nº Manometría	Nº Manometría/Impedancia	Nº PHmetria	Nº Ph/Impedancia	Nº Bilitec
NOMBRE Y APELLIDOS					
Fecha de nacimiento		Edad	Altura	Peso	IMC
DOMICILIO				Por CORREO	
Localidad		Provincia		C.P.	
Tlf.:					
Servicio Procedencia			Dr.		
¿Se ha hecho esta exploración anteriormente en este centro? Si ☐ No ☐ ¿cuándo?					
¿Desde hace cuánto tiempo padece los actuales síntomas? (__ meses) (__ años)					
¿Está operado de? Esófago Si ☐ No ☐ Hernia hiatal Si ☐ No ☐ Estómago Si ☐ No ☐ ¿en qué fecha?					
Especifique si padece alguna enfermedad crónica:					
Tratamiento que hace en la actualidad:					
IBPs (Omeprazol, Esomeprazol, Nexium) Si ☐ No ☐ Dosis:					
Opioides (Tramadol, Zaldiar...) Si ☐ No ☐ Dosis:					
Resto de medicación habitual :					
		MENOS de 2 Veces a la semana	2 VECES ó MÁS de 2 Veces a la semana	DIARIAMENTE	Le DESPIERTA en la NOCHE
¿Ardor o acidez en estómago?	NO ☐	☐	☐	☐	☐
¿Sensación de ardor o líquido ácido que sube a nivel retroesternal/hacia esófago o la boca?	NO ☐	☐	☐	☐	☐
Sensación de subida de comida o liquido al agacharse, tumbarse o espontáneamente	NO ☐	OCASIONAL ☐ DIARIO ☐ CON CADA COMIDA ☐		con AHOGO ☐ con TOS ☐	
Dificultad para tragar	NO ☐	OCASIONAL ☐ DIARIO ☐ CON CADA COMIDA ☐		A nivel de la garganta ☐ En la mitad del pecho ☐ Más abajo ☐ TRAGA PEOR: SÓLIDOS ☐ LÍQUIDOS ☐ AMBOS ☐	
¿Episodios de dolor en el pecho?	NO ☐	OCASIONAL ☐ DIARIO ☐ CON CADA COMIDA ☐		Durante el DIA ☐ Durante la NOCHE ☐	
¿Molestia/picor/carraspeo o sensación de cuerpo extraño en la garganta? Si ☐ No ☐					
Durante el DIA			Durante la NOCHE		
Pierde la VOZ con frecuencia ☐			☐		
Episodios de TOS ☐			☐		
Resultado radiológico y/o endoscópico:					
¿Mejoró con el tratamiento actual? Si ☐ No ☐					
¿Presenta pérdida de peso en los últimos meses? No ☐ <5 kg ☐ Entre 5 y 10 kg ☐ >10 kg ☐					

• Información sobre Manometría Esofágica con o sin Impedancia

La Manometría esofágica con o sin impedancia, se utiliza para el estudio del funcionamiento de su esófago. Ayuda a valorar a los pacientes con síntomas de “dificultad para tragar”, “dolor torácico”, “ardores”, “regurgitación” o “tos crónica”, que presentan trastornos motores del esófago, hernia hiatal o reflujo gastroesofágico, fundamentalmente.

**NO PUEDE TOMAR ALIMENTOS SÓLIDOS DURANTE 6 HORAS ANTES,
NI LÍQUIDOS EN LAS 2 HORAS PREVIAS A LA PRUEBA.**

- Se realiza mediante la introducción de un tubo fino (4 mm) a través de la nariz o la boca hasta el estómago.
- Ocasionalmente, y dependiendo del tipo de alteración sospechada, bien por su doctor o durante el desarrollo de la misma, se le puede administrar a través de la sonda o por vía parenteral alguna sustancia con objeto de reproducir sus síntomas o aclarar el diagnóstico.
- La duración de la prueba es inferior a 30 minutos. Puede sentir una sensación de picor o escozor en la nariz y ocasionalmente sensación de náusea y/o tos.

• Información sobre PHmetría de 24 horas con o sin Impedancia

La PHmetría de 24 horas con o sin Impedancia es una técnica que carece prácticamente de complicaciones, pudiendo notar una pequeña molestia en la introducción de la sonda. La tolerancia es buena.

Tiene por objeto medir la acidez que llega al esófago, en concreto, los episodios de reflujo gastroesofágico, valorando su número y duración. Para ello se introduce una sonda fina (2 mm de diámetro a través de un orificio nasal hasta el estómago. La sonda se conecta a un aparato registrador que usted llevará colgado en bandolera o al cinturón. **El equipo se le retirará a la mañana siguiente.**

Para cualquier duda puede llamar al teléfono 91 330 30 00 extensión 483101

Lea las siguientes instrucciones para obtener un buen resultado del estudio.

**NO PUEDE TOMAR ALIMENTOS SÓLIDOS DURANTE 6 HORAS ANTES,
NI LÍQUIDOS EN LAS 2 HORAS PREVIAS A LA PRUEBA.**

- Si está tomando alguna medicación para sus molestias digestivas que contenga: **Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, Esomeprazol** debe suspenderlo 10 días antes de la prueba.
- Si está tomando Ranitidina o Famotidina, suspéndalo 3 días antes de la prueba. No deberá suspender esta medicación si su médico así se lo ha advertido previamente.
- Si el ardor es muy intenso durante la prueba, puede tomar su alcalino habitual, anotando la hora exacta.
- Durante la prueba puede y debe hacer una vida normal, dentro de lo posible. La alimentación, horarios de comidas y descanso serán los habituales **¡¡ No restrinja las comidas !!**.
- No se puede duchar ni mojar ningún elemento del equipo.
- Anote la hora exacta que marca el aparato cuando suceda algún síntoma, incidencia o si se tuvo que retirar la sonda.
- Siga las instrucciones que el personal le dará el día de la prueba tanto para la recogida de datos como de

**EN CASO DE DISPONER RESULTADOS DE ENDOSCOPIA Y/O RADIOGRAFÍAS DE ESÓFAGO
DEBERA TRAERLAS EL DÍA DE LA PRUEBA**