

Microbiología Clínica



PREPARACIÓN DE PRUEBAS

Instrucciones de recogida de muestra de

Orina para Estudio de Micobacterias

Información

La prueba de orina se utiliza para detectar la presencia de *Mycobacterium tuberculosis* en casos de tuberculosis extrapulmonar, especialmente con sospecha de afectación renal o en pacientes inmunocomprometidos.

Tipo de muestra

Orina

Material necesario

- 3 Envases de plástico pequeño estéril tapón de rosca



Procedimiento

- Antes de la recogida de la muestra, se lavarán las manos y los genitales externos con agua y jabón y se secarán con una toalla limpia.
- Se recogerán **3 muestras** de la orina de la mañana (volumen mínimo de 40 ml.) en **3 días consecutivos**.
 - Destapar el envase estéril.
 - Recoger directamente la orina de la parte media de la micción (despreciando la primera parte de la micción).
 - Tapar y cerrar bien el envase.



- **Guardar en lugar refrigerado (nevera) cada muestra, cada día.**

- El **SEGUNDO Y TERCER** día se procederá de igual forma.
- Se **ENTREGARÁN** las **TRES MUESTRAS** a la vez, en el Centro Sanitario donde se recogieron los envases.

ESTA PRUEBA NO DEBE RECOGERSE DURANTE LA MENSTRUACIÓN.