

Microbiología Clínica



PREPARACIÓN DE PRUEBAS

Instrucciones de recogida de muestra para

Determinación de Helmintos en Heces

Información

Esta prueba se realiza para descartar que usted padezca una infección por parásitos intestinales del tipo Helmintos. Si así fuese, los parásitos se eliminarían por las heces, por eso, este es el modo de detectarlos y poder iniciar el tratamiento.

Tipo de muestra

Heces

Material necesario

- 3 Envase con cucharilla (contiene líquido conservador)



Procedimiento

- Lávese las manos con agua y jabón.
- Defeque sobre una superficie, recipiente (palangana. etc...) con cuidado de que no se mezcle con orina ni con sangre de la menstruación.
- Abra el envase con cuidado. **NO ELIMINAR** el líquido conservador del envase.

La cantidad de heces a introducir en el envase será la que quepa en la cucharilla que va unida a la tapa (**no se debe separar de ésta**).

Si el envase no llevara cucharilla la cantidad será más o menos del tamaño de una almendra, que se puede recoger con una cucharilla limpia.

NUNCA LLENAR EL ENVASE, SE RECHAZARÁ LA MUESTRA

- **TAPAR y AGITAR suavemente.**
- Debido a la expulsión intermitente de parásitos, para esta determinación es conveniente la recogida de **TRES muestras en días consecutivos**, cada una en un **envase distinto**.
- Las tres muestras recogidas deben guardarse **refrigeradas** (nevera) hasta entregarlas en el laboratorio de Microbiología lo antes posible.
- Lávese de nuevo las manos con agua y jabón.