

Microbiología Clínica



PREPARACIÓN DE PRUEBAS

Instrucciones de recogida de muestra para

Exudado Endocervical

Información

Es una prueba que se hace a mujeres para detectar microorganismos que puedan afectar a la mucosa vaginal, es sencilla y no dolorosa. Se colocará en posición ginecológica y se introducirá un espéculo en la vagina. A continuación se tomará una muestra de la mucosa vaginal con una torunda de algodón o hisopo.

Si nunca ha mantenido relaciones sexuales con penetración, la muestra se obtiene del orificio vaginal y no se utiliza espéculo.

Material necesario

Aplicador de algodón (hisopo)

Procedimiento

EL DÍA DE LA CITA PARA LA TOMA DE MUESTRA

- **LAVARSE** la zona genital solo con **agua y jabón neutro**.

RECUERDE:

- **No se podrá realizar la toma si se encuentra en periodo menstrual.**

Deberán transcurrir al menos 48 horas tras finalizar el mismo para garantizar una muestra óptima.

- Si recibe tratamiento antibiótico se lo comunicará al personal sanitario que le va a realizar la toma de la muestra.
 - Tienen que transcurrir 10 días tras la finalización del mismo para obtener una muestra óptima. El personal sanitario que le realice la toma le informará.
 - Se recomienda que anoten el nombre del medicamento.
- En caso de ser portadora de dispositivos vaginales (DIUs, pesario obstétrico, anillo vaginal anticonceptivo) se ruega informar al personal sanitario encargado de hacer la toma antes de realizarla.
- La toma de muestra endocervical deberá realizarse en un centro sanitario ya que precisa de la utilización de un espéculo.
- Se contraindica la toma de muestra endocervical en gestantes. En caso de estarlo, informe al personal sanitario, antes de realizar la toma de la muestra