

Microbiología Clínica



## PREPARACIÓN DE PRUEBAS

Instrucciones de recogida de muestra de

### Test de Graham

#### Información

Esta prueba permite hacer el diagnóstico de oxiuriasis (infección por oxiuros). Este parásito se aloja en el intestino, pero las hembras ponen los huevos en la zona perianal, especialmente durante la noche. El test permite recoger esos huevos para ser observados al microscopio.

#### Material necesario

Portaobjetos de cristal (suministrado por el centro sanitario) y una cinta adhesiva **transparente** de unos 5 cm de longitud (siempre de menor longitud que el portaobjetos de cristal).

#### Procedimiento

La muestra se debe recoger por la mañana, antes del aseo personal y la defecación. Cuando se trate de niños pequeños, al realizar el aseo de la zona la noche anterior, no añadir cremas ni polvos de talco.

- Levantar la cinta adhesiva **transparente** del cristal portaobjetos de forma que la parte adhesiva quede hacia la parte externa (figuras 1 y 2).
- Separar las nalgas descubriendo la región anal y perianal, aplicar y **presionar** el celofán adhesivo despegado del cristal sobre los márgenes del ano por ambos lados (figura 3 y 4).

- Colocar la cinta adhesiva de nuevo sobre el cristal procurando no formar burbujas.
- La cinta adhesiva no debe contener materia fecal.

