

Servicio de Diagnóstico por Imagen

## PREPARACIÓN DE PRUEBAS

Información para pacientes para la preparación de

# RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA

## Preparación general del paciente

- **AYUNAS** de al MENOS 6 HORAS, tanto de alimentos sólidos como líquidos. En caso de ser diabético notifíquelo a su llegada.
- **ANALITICA** que incluya tiempos de coagulación de menos de 3 meses de antigüedad. En caso de antecedentes de enfermedad hepática, oncológica o hematológica póngase en contacto con su médico por si fuese preciso solicitar una analítica más reciente con tiempos de coagulación.
- **CONSENTIMIENTO INFORMADO:** Léalo detenidamente con anterioridad a la fecha de la prueba. Si tiene alguna duda acuda sin cita de lunes a viernes en horario de mañana a la sección de Radiología Vascular-Intervencionista (Planta Baja Norte) para consultar con un Radiólogo Vascular-Intervencionista. No se olvide de traerlo firmado el mismo día de la prueba.
- **ES NECESARIO QUE ACUDA A LA INTERVENCIÓN ACOMPAÑADO.**

## Información sobre su Medicación

### ▪ **ANTIAGREGANTES**

Si usted toma ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg (Ej. Adiro® 100, Bartal® 100), no es necesario que lo suspenda.

Si usted toma cualquier otro antiagregante debe comunicarlo y ponerse en contacto con su médico quién valorará la posibilidad de suspenderlo una semana antes o disminuir la dosis a Adiro® 100 mg, cinco días antes del procedimiento.

### ▪ **ANTICOAGULANTES**

Si usted toma tratamiento anticoagulante con SINTROM® deberá comunicarlo y ponerse en contacto con su médico para realizar pauta de sustitución con

heparina subcutánea los 2-3 días previos al procedimiento.

Tenga en cuenta que DEBEN transcurrir al menos 24 horas desde la última dosis de heparina y la realización del procedimiento.

Si usted toma tratamiento con **ANTICOAGULANTES DE ACCIÓN DIRECTA** como XARELTO® (RIVAROXABAN), PRADAXA® (DABIGATRAN), ELIQUIS® (APIXABAN), etc. tenga en cuenta que deben transcurrir al menos 24 horas desde la última dosis del medicamento y la realización del procedimiento. Usted debe ponerse en contacto con su médico para que le indique con exactitud la pauta conveniente para su caso en particular.

Salvo en los casos anteriores, puede seguir tomando el resto de su medicación habitual. **ES IMPORTANTE QUE NO SUSPENDA LA MEDICACIÓN PARA LA TENSION ARTERIAL (Antihipertensivos):** Puede tomarla con medio vaso de agua.

**Ante cualquier duda que pueda tener con la medicación puede consultarla con su médico o directamente con cualquiera de los médicos de la Sección de Radiología Vasculare Intervencionista.**