

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

Cistogammagrafía

Información sobre la prueba diagnóstica

Se trata de un estudio para valorar posible reflujo vesico-ureteral.

Preparación para la prueba

- NO es necesario acudir en ayunas.
- Deberá beber al menos 1 litro de agua antes de la realización de la prueba.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

Se inyecta un radiofármaco en el antebrazo por vía intravenosa y a continuación se realiza un estudio de imagen para valorar la función renal y a continuación se realizarán imágenes adicionales en sedestación (antes, durante y después de la micción).

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Posibles efectos secundarios

No se han descrito intolerancias ni alergias al radiofármaco.

Precauciones en las horas posteriores a la prueba

Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y niños menores de 13 años.

En el caso de mujeres en periodo de lactancia debe suspenderse la misma durante 24 horas y desecharse la leche extraída durante ese periodo.

**SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE
MEDICINA NUCLEAR**