

Servicio de Medicina Nuclear

## PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

# DetECCIÓN DE GANGLIO CENTINELA EN TUMORES DE VULVA

## Información sobre la prueba diagnóstica

---

La biopsia selectiva del ganglio centinela es el procedimiento de elección para localizar el/los ganglio/s que deben ser extirpados en la cirugía de su tumor de vulva.

## Preparación para la prueba

---

- No se requiere ningún tipo de preparación especial para la prueba, salvo acudir en ayunas si se opera el mismo día.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

## Exploración

---

Se le inyectará un radiofármaco por vía intradérmica alrededor del tumor primario.

Inmediatamente después de la inyección se realizarán imágenes para tratar de localizar el/los ganglio/s centinela.

En la intervención quirúrgica el médico nuclear acudirá a quirófano para ayudar a localizar el/los ganglios que deben ser extirpados.

## Precauciones

---

Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.

## Contraindicaciones

---

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

## Posibles efectos secundarios

---

- Puede notar ligera molestia en los puntos de inyección.
- Los apósitos pueden generar reacciones cutáneas locales.

## Precauciones en las horas posteriores a la prueba

---

Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y niños menores de 13 años.

Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

**SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR**