

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

Detección de Hemorragia Digestiva

Información sobre la prueba diagnóstica

Estudio gammagráfico para localizar sitio de sangrado activo en tracto gastrointestinal no objetivado por endoscopia o colonoscopia y/o otras pruebas.

Preparación para la prueba

- NO es necesario que acuda en ayunas
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

Se le inyectará un radiofármaco por vía intravenosa.

Aproximadamente 1 hora, aunque es posible que requiera la adquisición de imágenes a los 90 min, 4 horas y 24 horas.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Precauciones en las horas posteriores a la prueba

Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y/o niños menores de 13 años.

En el caso de mujeres en periodo de lactancia debe suspenderse la misma durante el periodo de tiempo que se le indique al realizar la prueba.

Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR

Hospital Clínico San Carlos

Calle Prof. Martín Lagos s/n 28040 Madrid

Tel.: 91 330 30 00

www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos