

Servicio de Medicina Nuclear

## PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

# DetECCIÓN DE MUCOSA GÁSTRICA ECTÓPICA

## Información sobre la prueba diagnóstica

---

Estudio gammagráfico para localizar sitio de mucosa gástrica ectópica (Divertículo de Meckel).

## Preparación para la prueba

---

- AYUNO de 6 horas previa a la realización de la prueba.
- Evitar en lo posible exploraciones previas con Bario o fármacos que sean irritantes intestinales 2 ó 3 días anteriores a la prueba.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

## Exploración

---

Se le inyectará un radiofármaco por vía intravenosa.

Tiempo estimado de la prueba es aproximadamente **1 hora**.

## Contraindicaciones

---

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

## **Precauciones en las horas posteriores a la prueba**

---

Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y/o niños menores de 13 años.

En el caso de mujeres en periodo de lactancia debe suspenderse la misma durante el periodo de tiempo que se le indique al realizar la prueba.

Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

**SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR**