

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

Detección de Reflujo Gastroesofágico

Información sobre la prueba diagnóstica

Estudio gammagráfico para diagnóstico de reflujo gastroesofágico: episodios de pirosis o regurgitación o valoración de respuesta a la terapia antirreflujo.

Preparación para la prueba

- El médico remitente debe decidir qué medicamentos deben continuarse o suspenderse antes del estudio.
- Requiere ayuno previo a la exploración mínimo de 12 horas.
- En niños pequeños deberá hacer coincidir la realización de la prueba con toma de alimentación.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

Se le administrará por vía oral un radiofármaco mezclado con alimento sólida, semisólida, líquida o una mezcla de ambas.

Se realizarán a continuación imágenes para evaluar el funcionamiento esofagogástrico.

La duración de la prueba es de aproximadamente 40-60 minutos.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Precauciones en las horas posteriores a la prueba

Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y/o niños menores de 13 años.

En el caso de mujeres en periodo de lactancia debe suspenderse la misma durante el periodo de tiempo que se le indique al realizar la prueba.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR