

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

Estudio de Hiperplasia Condílea

Información sobre la prueba diagnóstica

Consiste en la realización de un estudio anatómico y funcional de la mandíbula.

Preparación para la prueba

- **NO** es necesario acudir en ayunas.
- Puede tomar su medicación habitual.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

Se inyecta un radiofármaco en el antebrazo por vía intravenosa.

Posteriormente tiene que esperar de 2 a 5 horas, a partir de la inyección del fármaco. Durante este tiempo **permanecerá en la Sala de Pacientes Inyectados**. A continuación, se realizará la adquisición del estudio.

Deberán beber 2-3 vasos de agua y orinar con frecuencia.

Precauciones

Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El médico le indicará si debe interrumpirla y por cuanto tiempo.

Durante las 24 horas posteriores a la inyección, deberá evitar el contacto próximo con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.

Es aconsejable beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear, antes de la inyección.

Efectos secundarios

- No produce dolor ni reacción alérgica.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR

Hospital Clínico San Carlos

Calle Prof. Martín Lagos s/n 28040 Madrid

Tel.: 91 330 30 00

www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos