

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

Gammagrafía con difosfonatos para Amiloidosis Cardíaca

Información sobre la prueba diagnóstica

Consiste en la realización de un estudio anatómico y funcional para valorar la presencia o no de amiloidosis cardíaca.

Preparación para la prueba

- No es necesario acudir en ayunas.
- Puede tomar su medicación habitual.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

- Se inyecta un radiofármaco en el antebrazo por vía intravenosa.
- Tiene que esperar de 2 a 3 horas, a partir de la inyección del fármaco. Durante este tiempo **permanecerá en la Sala de Pacientes Inyectados**. A continuación, se realizará la adquisición del estudio.
- Deberán beber 2-3 vasos de agua y orinar con frecuencia.

Precauciones

- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El médico le indicará si debe interrumpirla y por cuanto tiempo.
- Durante las 24 horas posteriores a la inyección, deberá evitar el contacto próximo con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.
- Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear, antes de la inyección.

Efectos secundarios

- No produce dolor ni reacción alérgica.
- La radiación para el paciente es similar a la de un estudio radiológico.
- Beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR