

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

Gammagrafía Peritoneal

Información sobre la prueba diagnóstica

Estudio gammagráfico para localizar la existencia de comunicación desde la cavidad peritoneal con otra cavidad (tórax, testicular etc)

Preparación para la prueba

- Deberá acudir en ayunas de 6 horas
- El médico remitente debe decidir qué medicamentos deben continuarse o suspenderse antes del estudio.
- Evitar en lo posible exploraciones previas con Bario o fármacos que sean irritantes intestinales 2 ó 3 días anteriores a la prueba.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

Se le inyectará un radiofármaco por el catéter peritoneal y luego se le infundirá el líquido de diálisis.

El tiempo estimado de la prueba es de aproximadamente 2 horas.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Precauciones en las horas posteriores a la prueba

Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y/o niños menores de 13 años.

En el caso de mujeres en periodo de lactancia debe suspenderse la misma durante el periodo de tiempo que se le indique al realizar la prueba.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR