

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

Gammagrafía de Receptores de Somatostatina

Información sobre la prueba diagnóstica

Consiste en la realización de un estudio para valorar posible tratamiento con somatostatina.

Preparación para la prueba

- No es necesario venir en ayunas.
- Puede tomar su medicación habitual. En el caso de estar recibiendo tratamiento con octreótide, se recomienda suspender el tratamiento de manera temporal para evitar un posible bloqueo de los receptores de somatostatina.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

Se inyecta un radiofármaco por vía intravenosa

Se realizarán imágenes en las 4 horas siguientes a la administración del radiofármaco. En ocasiones se realizará una imagen adicional a las 24 horas.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Posibles efectos secundarios

En muy raras ocasiones, puede presentarse cefalea o dolor epigástrico transitorios inmediatamente después de la administración.

Precauciones en las horas posteriores a la prueba

Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y niños menores de 13 años.

En el caso de mujeres en periodo de lactancia debe suspenderse la misma durante el periodo de tiempo que se le indique al realizar la prueba.

Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR